VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Patientinformation

Inför din gastroskopi

Gastroskopi innebär att en mjuk, smal slang förs in i munnen och vidare ned i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Med hjälp av gastroskopet går det att undersöka, ta bilder och prover.

Var god läs igenom hela informationen innan så att du kommer väl förberedd till mottagningen.

Förberedelser

Det är viktigt att det inte finns mat och vätska kvar i magsäcken när undersökningen börjar.

Inför gastroskopin behöver du därför ha **fastat i minst 6 timmar.** Det betyder att du inte ska ha ätit eller druckit något under den tiden.

Du som använder läkemedel

Om du behandlas med läkemedel kan du behöva justera dina mediciner innan undersökningen.

Blodförtunnande läkemedel		**Det här behöver du göra**
Läkemedelsnamn Pradaxa, Dabigatran Ravroxaban, Xarelto Eliquis Lixiana	**Substans** Dabigatranetexilat Rivroxaban Apixaban Edoxaban	Du som behandlas med något av de här blodförtunnande läkemedlen ska **inte** ta läkemedlet på undersökningsdagens morgon.
Waran	Warfarin	Du ska ta ett **PK-prov på undersökningsdagen**. Ring laboratoriemedicin i god tid och boka din provtagning. Telefonnummer hittar du på sista sidan.
Läkemedel	**Det här behöver du göra**	
Insulin- eller tablettbehandling vid diabetes	Kontakta ditt diabetesteam i god tid innan undersökningen och rådfråga om du behöver göra justeringar av dina läkemedel.	
Övriga läkemedel, till exempel blodtrycksmediciner	Om du har andra mediciner kan du ta dem som vanligt med **lite** vatten, dock inte senare än två timmar innan undersökningen.	

Om du har **pacemaker eller implanterad defibrilator, ICD**, ska du ringa oss på Endoskopimottagningen och meddela det.

Så går en gastroskopi till

Innan undersökningen får du lokalbedövning i svalget i form av en sprej. Efter sprejen får du inte äta och dricka på en timme på grund av att det finns risk att du sväljer fel så länge som bedövning verkar. En del tycker att gastroskopi är obehagligt. Berätta för personalen om det är så för dig. Det finns möjlighet att få **lugnande och smärtstillande** mediciner. Då sätter vi en infart i ett blodkärl i armen innan undersökningen.



Om du får avslappnande eller smärtlindrande medicin i samband med undersökningen får du **inte köra bil eller andra fordon** under resten av dagen.

Du får ligga på en brits på din vänstra sida. Du får bita om ett munstycke med ett hål. Det är för att du inte ska råka bita i slangen. En kameraförsedd mjuk slang förs in i munnen och vidare ner i matstrupen, magsäcken och ut i den övre delen av tolvfingertarmen. Bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att slemhinnan kan inspekteras noggrant.

Det här kan man göra med gastroskopi

Först och främst tittar man på hur svalg, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm ser ut. Om det behövs kan man ta vävnadsprover av slemhinnan för mikroskopisk undersökning. Det går också att göra mindre kirurgiska ingrepp via slangen, exempelvis ta bort polyper.

Undersökningen tar ungefär 5–10 minuter. Hela besöket tar ungefär 30 minuter.

Du kan läsa mer om gastroskopi på 1177.se.

Kontakt

Endoskopimottagningen, NU-sjukvården

Telefon:	010-435 35 80
Telefontider:	måndag-torsdag 08:00-11:00
	fredag 08:00-10:00
eller logga in på	www.1177.se

Laboratoriemedicin, NU-sjukvården

Telefon:	010-435 27 01
Telefontider:	måndag-onsdag 10:30-14:30
	torsdag-fredag 10:30-13:45
	lunchstängt 12:00-13:00