

Patientinformation

Inför koloskopi och gastroskopi

Du har fått en tid för koloskopi och gastroskopi. Det är endoskopiska undersökningar där man kan undersöka, ta bilder och prover i din tjocktarm respektive matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Endoskopi innebär att en mjuk, smal slang utrustad med en kamera förs in i kroppen.

Före undersökningarna behöver du göra en del förberedelser. Du kommer att behöva följa kostråd och laxera dig. Du som använder vissa läkemedel kan behöva göra justeringar i hur du tar dem veckan innan undersökningen.



Var god läs igenom hela informationen minst en vecka innan undersökningen så att du kommer väl förberedd till mottagningen.

Det är viktigt att du startar förberedelserna en vecka innan undersökningen.



Tänk på att du kan få läkemedel som gör att du **inte ska köra bil eller andra fordon** efter undersökningen.

Innehåll

Inför din koloskopi och gastroskopi	1
Förberedelser	2
Du som använder läkemedel	2
Laxeringsanvisningar	3
Koloskopi	6
Så går en koloskopi till	6
Gastroskopi	7
Så mår du efteråt	7
När får jag svar?	8
Kontakt	8

Förberedelser

En vecka innan undersökningen ska du börja förbereda dig. Först ska du äta fiberfattig kost i fem dagar. Ett par dagar innan undersökningen kommer du att ta laxerande tabletter och dricka laxerande medel. Det är för att tarmen måste vara helt ren på undersökningsdagen. Om du tar läkemedel är det viktigt att kontrollera om de läkemedel du använder finns med i listan nedan.

Du som använder läkemedel

De flesta läkemedel kan du ta som vanligt. Men, om du har till exempel diabetes eller använder blodförtunnande läkemedel, kan du behöva justera din medicinering före undersökningen.

Blodförtunnande läkemedel		Det här behöver du göra
Läkemedelsnamn Clopidogrel, Plavix Prasugrel, Efient Brilique Pradaxa, Dabigatran Rivaroxaban, Xarelto Eliquis Lixiana Trombyl	Substans Klopidogrel Prasugrel Tikagrelor Dabigatranetexilat Rivaroxaban Apixaban Edoxaban Acetylsalicylsyra	Vänligen kontakta oss på endoskopimottagningen så snart som möjligt om du använder något av dessa läkemedel, om det inte tydligt framgår av din kallelse hur du ska hantera medicineringen. Du som tar Trombyl kan fortsätta ta den som vanligt.
Läkemedel	Det här behöver du göra	
Waran (Warfarin)	Ring till AK-mottagningen en vecka före undersökningen. Du behöver ta ett PK-prov på undersökningsdagen. Ring laboratoriemedicin i god tid och boka en tid för provtagning.	
Läkemedel	Det här behöver du göra	
Insulin- eller tablettbehandling vid diabetes	Kontakta ditt diabetesteam i god tid innan undersökningen och rådfråga om du behöver göra justeringar av dina läkemedel.	
Tillskott av järntabletter	Du som har behandling med järntillskott ska göra uppehåll med det en vecka innan undersökningen.	
Bulkmedel, till exempel Lunelax och Inolaxol	Gör uppehåll med bulkmedel tre (3) dagar innan undersökningen.	
Övriga läkemedel, till exempel blodtrycksmediciner	Du kan fortsätta ta dina läkemedel som du brukar.	

Du som har en **pacemaker eller en implanterad defibrilator (ICD)**, ska ringa till oss på Endoskopimottagningen och meddela det.

Laxeringsanvisningar

Läs igenom hela informationen noga innan du påbörjar förberedelserna. Det är viktigt att du följer våra instruktioner här noggrant. En ren tarm är en förutsättning för en lyckad undersökning.

Du behöver köpa följande läkemedel:

- laxeringsmedlet Plenvu
- laxerande Toilax-tabletter 5 mg. Du behöver 4 tabletter.



Läkemedlen kan du köpa på valfritt apotek. Båda läkemedlen är receptfria.

Här följer en sammanställning av hur du ska äta och dricka innan undersökningen. Nedanför finns detaljerad information om hur laxeringen går till.

Antal dagar innan koloskopin	Det här ska du göra
7 dagar innan 6 dagar innan 5 dagar innan 4 dagar innan 3 dagar innan	Ät mat som inte innehåller fullkorn, frön, kärnor och skal. Drink gärna mycket valfri dryck.
2 dagar innan	Du får bara äta flytande kost utan bitar. Valfria drycker utan fruktkött. <ul style="list-style-type: none"> • Klockan 10:00: Ta 2 tabletter Toilax • Klockan 20:00: Ta 2 tabletter Toilax Använd bara tabletterna, tuben som följer med i förpackningen behöver du <u>inte</u> använda.
1 dag innan	Drink bara klara drycker <ul style="list-style-type: none"> • Klockan 18:00: Börja dricka dos 1 av Plenvu
Undersökningdagen	Drink bara klara drycker. Sluta dricka minst 2 timmar innan din gastroskopi. <ul style="list-style-type: none"> • Börja dricka dos 2 av Plenvu senast fyra timmar innan du åker hemifrån



Drink mycket dagarna före undersökningen och under laxeringen, helst inte bara vatten. Det behövs både lite sött och salt för att hålla vätske- och sockerbalansen på en bra nivå. Du kan också ta druvsockertabletter.

En vecka innan undersökningen

Du ska nu äta fiberfattig kost under fem dagar.

Tips på mat med lite fibrer

Frukost

- Fil, yoghurt, kvarg. Välj en slät variant utan fruktkött och kärnor
- Risgrynsgröt, mannagrynsgröt, havregrynsgröt (ej fiberhavregryn)
- Äpple, päron, banan, nektarin, persika, avokado – de ska vara skalade och utan kärnor
- Äppelmos
- Ägg, omelett, pannkaka
- Keso
- Vitt/ljust bröd, till exempel formfranska, tunnbröd, salta kex, smörgåsrån
- Pålägg: Ost, mjukost, skinka, kalkon, salami, leverpastej, kaviar

Lunch/middag

- Fisk, fiskbullar, tonfisk, skaldjur
- Kött, köttfärs, köttbullar
- Kyckling, kalkon
- Korv, kokt, stekt eller ugnsbakad
- Quorn, tofu, oumph
- Potatis utan skal, pasta, ris, couscous, bulgur (ej fullkorn)
- Släta/passerade/mjuka soppor (typ Kelda), fisksoppa
- Rotsaker (kokade och mjuka)

Övrigt

- Glass, vetebröd, kakor, chips, ostbågar, godis och choklad utan nötter

Du ska inte äta det här

- Fiberrik mat, till exempel fullkornsprodukter, grovt bröd, müsli, linfrö, chiafrö
- Citrusfrukter, hallon, lingon, blåbär, vindruvor, melon med kärnor, kiwi, ananas
- Grönsaker eller frukter med grovt skal eller kärnor, till exempel tomat, paprika, bönor, oliver, majs
- Nötter, quinoa, sparris

Två dagar innan undersökningen

I dag ska du inte äta någon fast föda. Du får endast äta flytande kost utan bitar i. Du kan dricka valfri dryck. Du ska också ta Toilaxtabletter två gånger under dagen.

Tips på flytande kost

- Släta soppor, mjölk, fil, yoghurt, kvarg
- Juice utan fruktkött, provivadrycker, saftsoppor, nyponsoppa
- Släta fruktkrämer, glass utan bitar
- Smoothies, mjölkbaserade näringsdrycker, proteindrycker

Laxeringen startar med tablett Toilax

- Klockan 10:00 ska du ta 2 tabletter Toilax à 5 mg
- Klockan 20:00 ska du ta 2 tabletter Toilax à 5 mg

Tabletterna hjälper till att "få i gång" magen. Verkningsstiden varierar, oftast mellan 6–10 timmar. Du ska inte använda tuben med rektalsuspension som följer med i förpackningen med Toilax.

Dagen innan undersökningen

I dag ska du inte äta något alls. Du får bara dricka klara drycker som är genomskinliga/vattniga. Det är viktigt att du dricker mycket dagen innan koloskopin.

Klara drycker

- Vatten, buljong utan bitar, äppeljuice, juice utan fruktkött, saft
- Kaffe och te utan mjölk
- Läskedryck, lättöl, honungsvatten, vätskeersättning (Resorb), klara näringsdrycker



Drick gärna varma drycker med socker eller honung i så att du inte blir frusen och får huvudvärk.

Laxering med Plenvu dos 1

I dag ska du börja med den laxerande vätskan Plenvu. Följ tiderna noga enligt våra instruktioner nedan.

- Blanda dos 1 av Plenvu enligt instruktionerna på förpackningen. Du kan kyla vätskan om du vill.
- Börja dricka Plenvu klockan 18:00.
- Drick vätskan med Plenvu långsamt under 45–60 min. Drick vartannat glas med valfri klar dryck och vartannat glas med Plenvu.

När du har druckit Plenvu kommer du att få en vattnig diarré så att tarmen töms ordentligt. Du behöver därför vara i närheten av en toalett. Du kan lägga på en skyddande kräm eller fet salva runt analöppningen för att skydda huden innan diarrén börjar.

- Drick inte Plenvu fortare än vad som står i anvisningen. Du kan lätt bli illamående om du dricker medlet fortare än angiven tid.
- Fortsätt att dricka klara drycker under hela kvällen. Det hjälper till att skölja rent i tarmen. Att röra på sig främjar tarmmotoriken.

På undersökningsdagen

Du ska inte äta något före undersökningen. Det är bra om du dricker klara drycker.

Laxering med Plenvu dos 2

- Blanda påse A+B av Plenvu enligt instruktionerna på förpackningen. Du kan kyla vätskan om du vill.
- Börja dricka Plenvu dos 2 senast fyra timmar innan du åker hemifrån. Det kan innebära att du behöver gå upp på natten för att hinna få i dig medlet och sedan även tömma tarmen innan resan hit.
- Drick långsamt under 45–60 min, vartannat glas valfri klar dryck och vartannat glas Plenvu.
- Du kan fortsätta att dricka klara drycker fram till två timmar innan undersökningen.

Koloskopi

Med koloskopi kan man utreda besvär som till exempel blodbrist, diarré, förändrade avföringsvanor eller blod i avföringen. Med en koloskopi kan man hitta orsaker till symtomen. Det kan vara inflammation, tarmfickor, polyper och tumörer.

Det här kan man göra med koloskopi

Först och främst tittar man på hur tarmen ser ut. Om det behövs kan man ta vävnadsprover från tarmens slemhinna för mikroskopisk undersökning. Det går också att göra mindre kirurgiska ingrepp via slangen, exempelvis att ta bort polyper. Ingreppen i tarmen brukar inte göra ont eftersom man inte har smärtnerver i tarmens slemhinna.

Så går en koloskopi till

Det är en läkare eller en sjuksköterska som gör koloskopin. Det brukar även vara med en eller två personer som hjälper till, exempelvis för att ta prover eller ge läkemedel.

Du får byta kläder till en skjorta och ett par byxor som tillåter tillgång till ändtarmen men som täcker underlivet.

Innan undersökningen får du en venkateter. I den kan man ge avslappnande och smärtstillande medel om du behöver det. Det är viktigt att du berättar om något känns obehagligt eller gör ont under undersökningen.

Koloskopet förs in

När undersökningen börjar ligger du på vänster sida på en brits. Under undersökningen kan du behöva ändra ställning.

Koloskopet är en böjlig slang som är ungefär en och halv meter lång och en centimeter i diameter. Det förs in genom ändtarmsöppningen och vidare in i tarmen. Koloskopet har en kamera och bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att tarmens insida kan inspekteras noggrant. Du kan titta på skärmen och se hela undersökningen.

Så känns koloskopi

Just när koloskopet förs in i ändtarmen kan det kännas obehagligt. Det kan också kännas obehagligt när koloskopet förs fram i tarmen, det beror på att tarmen sträcks ut. Säg till personalen om det gör ont. Du får då smärtstillande läkemedel. Läkemedlet börjar verka direkt.

En koloskopi tar mellan 15 och 60 minuter. Det kan vara svårt att i förväg veta hur lång tid en undersökning tar.

Du kan läsa mer om [koloskopi på 1177.se](http://koloskopi.på1177.se).

Gastroskopi

Innan undersökningen får du lokalbedövning i svalget i form av en sprej. Efter sprejen får du inte äta och dricka på en timme på grund av att det finns risk att du sväljer fel så länge som bedövning verkar. En del tycker att gastroskopi är obehagligt. Berätta för personalen om det är så för dig. Det finns möjlighet att få **lugnande och smärtstillande** mediciner.

Du får ligga på en bräda på din vänstra sida. Du får bita om ett munstycke med ett hål. Det är för att du inte ska råka bita i slangen. En kameraförsedd mjuk slang förs i munnen och vidare ner i matstrupen, magsäcken och ut i den övre delen av tolvfingertarmen. Bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att slemhinnan kan inspekteras noggrant.

Det här kan man göra med gastroskopi

Först och främst tittar man på hur svalg, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm ser ut. Om det behövs kan man ta vävnadsprover av slemhinnan för mikroskopisk undersökning. Det går också att göra mindre kirurgiska ingrepp via slangen, exempelvis ta bort polyper.

Undersökningen tar ungefär 5–10 minuter. Hela besöket tar ungefär 30 minuter.

Du kan läsa mer om [gastroskopi på 1177.se](http://gastroskopi.på1177.se).

Så mår du efteråt

Efter gastroskopin får du **inte äta eller dricka på en timme**. Det beror på att svalget är bedövat och du kan få ner mat eller dryck i luftstrupen i stället för i matstrupen. Efter koloskopin kan du äta som vanligt.

Om du har fått lugnande eller avslappnande medel ska du **inte köra bil eller andra fordon samma dag** som du har gjort undersökningen. Din reaktionsförmåga kan vara nedsatt, även om du känner dig pigg.

De flesta kan gå hem direkt efter undersökningarna. Om du har fått mycket lugnande och smärtstillande läkemedel kan du behöva vila en stund innan du går hem. Buken kan kännas spänd av gaser en stund efter koloskopin. Besvären brukar försvinna inom några timmar. Du kan behöva ta det lite lugnare än du brukar resten av dagen. Det beror på hur du mår.

Det kan kännas lite ömt och obehagligt i svalget i något dygn efter gastroskopin.

Komplikationer

Koloskopi och gastroskopi är mycket säkra metoder med liten risk för komplikationer. Risken för komplikationer ökar något när vissa ingrepp görs, till exempel borttagning av större polyper. Risken för komplikationer ökar med stigande ålder. I sällsynta fall kan man skada tarmens vägg alternativt att det uppstår en större blödning. I de flesta fall kan man lösa det under undersökningen. Det är väldigt ovanligt att man behöver göra ett större kirurgiskt ingrepp.

Du ska söka vård om

- Du får ihållande buksmärtor (starkare än vanligt magknip) som inte släpper.
- Du upplever tecken på en större blödning. Det visar sig genom svart eller blodig avföring, eller som svart eller blodig kräkning.
- Du får feber av oklar orsak.

När får jag svar?

Ofta kommer vi fram till en diagnos i samband med koloskopin och gastroskopin och kan sätta i gång med vidare behandling eller ytterligare utredningar direkt. Om vi tar vävnadsprover för mikroskopisk undersökning kan det ta upp till två månader innan du får svar på proverna. Vi informerar dig när vi får svaret. Den läkare som remitterade dig kommer också att få en kopia av resultatet.

Vid upptäckt av cancer sätter vi i gång en utredning direkt med speciella röntgenundersökningar. Vi kommer även att kontakta läkare på kirurgkliniken så att de kan planera för ett snabbt omhändertagande av dig.

Kontakt

Endoskopimottagningen, NÄL

Telefon: 010-435 35 80
Telefontider: måndag-torsdag 08:00-11:00
fredag 08:00-10:00

eller logga in på www.1177.se

AK-mottagningen, NÄL

Telefon: 010-435 48 30
Telefontider: måndag-torsdag 09:00-10:00 och 14:00-15:00
fredag 09:00-10:00

Laboratoriemedicin, NU-sjukvården

Telefon: 010-435 27 01
Telefontider: måndag-onsdag 10:30-14:30
torsdag-fredag 10:30-14:00
lunchstängt 12:00-13:00