



Patientinformation
Avdelning 51 NU-sjukvården

Bronkoskopi

Du skall genomgå en bronkoskopi – en undersökning där luftvägarna undersöks med hjälp av ett slangliknande instrument med kamera som förs via munnen över stämbanden och ner i luftvägen.

Samtidigt som man ser hur lufttrådet ser ut kan man också ta olika prover, så som bakterieodlingar och cellprover.

Förberedelser

Prover. På inläggningdagen tar vi blodprover och lungröntgen samt mäter din lungvolym i en apparat som du får blåsa i.

Fasta. Du får inte äta eller dricka efter klockan 24.00 natten innan undersökningen.

Medicinering. På morgonen, ca en timme innan undersökningen, får du en spruta med medicinering, antingen i benet eller i skinkan. Du blir trött och torr i munnen av sprutan. Gå EJ upp ur sängen efter att du fått sprutan – du kan ramla. Toalettbesök och tvättning måste klaras av innan du får sprutan.

Klädsel. Du har vanliga sjukhuskläder eller dina egna kläder på dig, skjorta och underbyxor går också bra om du inte vill ha mer på dig.

Nål. Du får en blodkärlsaccess (av plast) i ett blodkärl i armen, ifall du skulle behöva läkemedel under bronkoskopin.

Transport. Du får åka i din säng till lungmottagningen, där bronkoskopin görs. Är du klädd ligger du ovanpå täcket.

Bedövning. Det gör vanligen inte ont att göra en bronkoskopi, men för att dämpa host- och svalgreflexer får du bedövning sprayad i halsen. Bedövningen ges också i luftrören, genom instrumentet, för att du inte skall hosta.

Undersökningen tar ca 15–20 minuter. Under tiden för undersökningen brukar man inte känna några större obehag. Om det skulle vara jobbigt kan vi ge dig sömnmedicin och hostmedicin direkt i blodet, genom den nål du har i armen.

Efter undersökningen

Efter undersökningen åker du i säng tillbaka till avdelningen. Nu brukar de flesta vara trötta och vilja sova i några timmar. Du får inte gå ur sängen på 4 timmar.

Du får inte äta eller dricka på 4 timmar efter bronkoskopin. Eftersom du är bedövad i halsen kan du svälja fel.

Ibland kan man uppleva luftvägsirritation, ökad hosta och heshet. Vid enstaka fall kan upphostningen vara blodtillblandad, speciellt om provtagning skett. Prata med din avdelningssköterska om du har blod i upphostningen.

Du får inte lov att köra bil samma dag som undersökningen.

Undersökningsfynd sammanfattas oftast dagen efter vid läkarronden.