

## Utsättning av läkemedel inför ingrepp/undersökning

Du har kallats för en undersökning där läkemedel som ökar blödningsbenägenheten måste sättas ut innan. Detta är vanligtvis en torako-/bronkoskopi med biopsiprovtagning, en tappning av vätska från lungsäcken, en nålbiopsi genom bröstkorgsväggen eller annat specificerat ingrepp kopplat till åtgärd eller utredning. **Om inget annat specificerats**, bör du **två dagar** före undersökning avstå vissa mediciner som innehåller eller är släkt med acetylsalicylsyra till exempel;

- Treo, Treo Comp

samt andra läkemedel som påverkar koagulation och kroppens blödningshämmande proppbildning:

- Diklofenak, Pronaxen, Orudis, Ipren och Alganex.

**Om inget annat specificerats**, bör du som nyttjar någon av följande proppförebyggande/"blodförtunnande" mediciner att **sätta ut den/pausa den enligt följande**:

- **Trombyl, Persantin** (Acetylsalicylsyra) – 2 dagar före undersökning
- **Eliquis** (Apixaban) – 2 dagar före undersökning
- **Pradaxa** (Dabigatran) – 2 dagar före undersökning
- **Xarelto** (Rivaroxaban) – 2 dagar före undersökning
- **Brilique** (Ticagrelor) – 5 dagar före undersökning
- **Clopidogrel, Plavix, Cloriocard** (Clopidogrel) – 5 dagar före undersökning
- **Effient, (Prasugrel)** – 7 dagar före undersökning
  
- **Fragmin** – minst 12 timmar före undersökning
- **Waran** (Warfarin) – målvärde  $\leq 1,5$  (INR) dagen före undersökning, för att få reda på exakt hur du ska pausa din Waran-medicinering måste du ta kontakt med din ordinarie AK-mottagning.

**Vart vänder jag mig om jag har frågor eller behöver ändra/avboka tid?**

Lungmottagningen telefon: 010-4354850

Måndag-torsdag klockan 06:00 – 10:00, Fredag klockan 06:00 – 09:00

Medicinska frågor: knappval 4

Tid- och bokningsfrågor: knappval 5