

Patientinformation

Information till dig som haft högt blodtryck under graviditeten

Din diagnos

- Kronisk eller nydiagnostiserad hypertoni
- Graviditetshypertoni under graviditeten
- Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) under graviditeten
- Svår havandeskapsförgiftning (preeklampsi) under graviditeten
- Eklampsi (kramper i samband med graviditet)
- HELLP (påverkan på levern, njuren eller blodkoagulation)

Planering

- Till dig som har behandlats för högt blodtryck. Blodtrycket är nu normalt och du behöver inte någon medicin

Du ska kontrollera ditt blodtryck om 1 vecka på _____

- Till dig som har behandlats med medicin för högt blodtryck före eller under graviditeten och ska fortsätta med medicinering

Du skall fortsätta med _____

Du ska kontrollera ditt blodtryck den _____ på _____

Du ska träffa läkare den _____ på _____

Du ska även kontrolleras hos läkare om 6 – 8 veckor på _____

Vid besök efter förlossningen finns möjlighet till samtal och möjlighet ställa ytterligare frågor.

Du rekommenderas årliga kontroller av ditt blodtryck. Kontakta till exempel din distriktssköterska.

Undertecknad ansvarig och telefonnummer