

Patientinformation

Dränagebehandling av bröstabscess

Idag den _____ har en Pigtail-kateter French 8 lagts i en bröstabscess.

För att abscessen ska kunna läka ut på bästa sätt ska du spola abscesshålan med steril koksaltlösning **3 gånger/dygn**; morgon, lunch, kväll

Sköljningen går till på följande sätt

Mellan påsen och katetern finns en 3-vägskran med en öppning för sprutorna.

Vrid på 3-vägskranen för att öppna och stänga när du ska spola abscessen

- Med kranen stängd, koppla på en spruta fylld med steril koksaltlösning, öppna kranen och spola försiktigt tills du upplever en lätt spänningskänsla eller att ett motstånd känns. Anteckna mängden
- Stäng kranen. Byt till tom spruta, öppna kranen och sug ut vätskan – en del rinner eventuellt rak ner i påsen.
- Upprepa proceduren 3 – 4 gånger tills sköljvätskan ser klar ut.



Figur 1 stängd kran

Under läkningsprocessen minskar abscesshålan successivt i storlek. Du kommer märka det genom att en mindre mängd koksaltlösning kan sprutas in. Vanligtvis får katetern ligga kvar tills mängden du spolar med understiger 10ml vid minst 3 spolningstillfällen i rad.

Ibland när abscesshålan har dragit ihop sig, kan det plötslig gå att spola in större mängder. Dock rinner koksaltet ut bredvid slangen och förbandet blir blött. Du kan också känna att det ömmar vid stickpunkten. Detta är inte farligt och är ytterligare ett tecken på att katetern kan tas bort.

Hela processen tar i snitt 3–7 dagar.

Fortsätt amma eller pumpa - vi ger dig råd så du får till en fungerande situation.

Vid frågor ring BB/Amningsmottagningen: 010-435 24 30



Figur 2 öppen kran