

Patientinformation

كيف يتم الأجهاض الجراحي: kirurgisk abort

يمكن إجراء الأجهاض الجراحي عندما تكون فترة الحمل أقل من ثلاث عشرة أسابيع , ويمكن التأكد من مدة الحمل من خلال الكشف الطبي قبل عملية الأجهاض. و لتسهيل عملية الأجهاض الجراحي و لتخفيف الآلام قدر الأمكان , يستعمل نوع من الدواء على شكل حبوب مهبلية توضع داخل المهبل ثلاث ساعات قبل البدء بعملية الأجهاض , وهذه الحبوب تسمى سيتوتك (0,2 ملغ cytotec) حيث تساعد على ارتخاء عنق الرحم وتسهل عملية الأجهاض (الكرتاج أو بمعنى أخر تنظيف بطانة الرحم) و من الأعراض الجانبية لهذا الدواء الآم ونزف تشبهان الآم ونزف الدورة الشهرية و لتخفيف هذه الآم يمكن بلع ثلاث حبات بانوديل(500 ملغ).

و عند أستخدام هذا الدواء تكون عملية الأجهاض قد بدأت.

يوم عملية الأجهاض:

في اليوم المحدد لأجراء عملية الأجهاض , يجب أخبار قسم النسائية بالحضور وتسجيل الأسم هناك , ثم الذهاب الى ردهة الخامسة والأربعون للتحدث مع الممرضة , ثم يتم مرافقة المريضة الى قسم العمليات . في قسم العمليات يتم التحدث مع طبيب التخدير و الطبيب الذي يقوم بعملية الكرتاج و كذلك التحدث مع ممرضة التخدير التي ترافقك الى غرفة التحضير , ثم تقوم ممرضة التخدير بوضع حقنة وريدية (كانيولا) في الذراع و من خلالها يزرق دواء سريع الفعالية الذي يساعد على الأرتخاء والنوم. ثم يأتي الطبيب بألة ماصة خاصة يقوم من خلالها بمص جميع محتويات الرحم عن طريق عنق الرحم , و تجمع أنسجة الحمل في جهاز خاص ثم ترسل الى الحرق. هذه العملية لا تحتاج الى أكثر من دقائق.

بعد الأنتهاء من عملية الكرتاج (الأجهاض) والتي لا تستغرق سوى دقائق كما ذكرنا , يتم أيقاض المريضة مباشرة و يتم مرافقتها الى ردهة المراقبة لأسترجاع الوعي الكامل و عند الشعور بالتحسن يمكن مغادرة المستشفى. و يجب الأخذ بالحسبان أذ لايمكن قيادة السيارة في هذا اليوم و ذلك لوجود أدوية التخدير في الجسم حيث يبقى تأثيرها ليوم كامل , لذا يفضل أن يقوم الشخص المرافق بقيادة السيارة و المساعدة في الوصول الى المنزل.

مباشرة بعد الكرتاج يمكن وضع اللولب (سبيرال) داخل الرحم , أو وضع (p - stav) و هي نوع من أنواع الحمل توضع تحت جلد الذراع , أما أذا تم أختيار حبوب منع الحمل فيمكن البدء به مساء نفس اليوم أو صباح اليوم التالي.

يمكن أخذ أجازة مرضية ليوم واحد فقط (يوم العملية) ليس أكثر.

بعد الأجهاض:

بعد عملية الكرتاج يستمر النزف لمدة سبعة - عشرة أيام وتكون كمية الدم قليلة و تنقطع بالتدريج , وفي أغلب الأحيان لا تكون هناك آلام كثيرة في أسفل البطن و لكن عند الشعور بالآلام فيمكن أخذ مسكنات مثل حبوب ألفيدون , أبرين أو أيبوميثين. خلال فترة النزف يجب تجنب أستخدام اللفافات القطنية المهبلية (tampong), و منع الأتصال الجنسي و الغطس في الماء أو السباحة.

الدورة الشهرية الطبيعية تعود بعد ثلاث - ست أسابيع من عملية الكرتاج و أول دورة تكون غزيرة نوعا ما.

أن نسبة حدوث المضاعفات بعد عملية الكرتاج تكون قليلة ولكن من الأفضل أن يكون لديك معلومات كافية عند حدوثها:

من الممكن حدوث ألتهابات مهبلية أو رحمية وتظهر على شكل آلام إضافية حديثة في أسفل البطن لا تشبه آلام الدورة الشهرية , أرتفاع درجة الحرارة و أستمرار النزف ويمكن علاجه بأخذ مضادات حيوية.

و في قليل من الأحيان يمكن أن لاينجح عملية الكرتاج بتنظيف محتويات الرحم (الحمل) كاملة, و لتأكد من نجاح عملية الكرتاج أو الأجهزة يجب إجراء فحص الحمل عن طريق الأدرار و ذلك بعد ثلاث - أربع أسابيع من عملية الكرتاج.

في حالة حدوث أي من المضاعفات التي تم ذكرها , يجب الأتصال بالمستشفى لأخذ الأرشادات اللازمة , وقد تحتاج الحالة الى كشف طبي و ذلك بعد تقييم الممرضة للوضعية. أرقام الهواتف موجودة على ظهر الورقة.

المراجعة:

من المهم جداً التأكد بأن عملية الأجهزة (الكرتاج) قد نجحت و ذلك بأجراء فحص الحمل عن طريق الأدرار بعد ثلاث - أربع أسابيع من عملية الكرتاج , ويتم الحصول على هذا الفحص من الممرضة . يمكن إجراء هذا الفحص في البيت ثم الأتصال بالممرضة و أخبارها النتيجة أو إجراء الفحص عند الممرضة في موعد المراجعة وذلك إذا كنت راغبة في هذه الزيارة و الذي يكون السبب الرئيسي منها هي التأكد من الحالة النفسية بعد الأجهزة .

أن أتخاذ قرار أسقاط الحمل ليس بالقرار السهل حيث تراود المرأة الحامل أسئلة و أفكار و خواطر قد لم تراود المرأة من قبل , فلا تترددين في الأتصال بنا إذا كنت بحاجة الى شخص أحر لتحدث عن أفكارك و خواطرك.

أرقام الهواتف موجودة في أسفل الصفحة.

Besök1 dat kl الساعة: الزيارة الأولى:

Besök2 dat kl الساعة: الزيارة الثانية:

2 tab cytotec + 3 tab panodil ska du ta kl : حبتان سيتوتيك توضع داخل المهبل و بلع ثلاث حبات بانوديل , الساعة:

kontakt sjuksköterska الممرضة المسؤولة:

tel : رقم التلفون:

Gynekologmottagningen
NU-sjukvården – NÄL
Telefon 010-435 22 00

Avdelning 35
NU-sjukvården – NÄL
Telefon 010-435 03 50