



Patientinformation

Information till dig som behandlats med Botox[®] mot överaktiv blåsa

När är behandling med Botox aktuellt?

Vid överaktiv blåsa med mycket trängningar och inkontinens där annan behandling inte gett tillräcklig effekt. Innan beslut om Botoxbehandling görs en grundlig utredning på Uroterapiavdelningen.

Hur verkar behandlingen?

Botox gör att blåsmuskeln slappnar av. Övergående kan effekten bli så god att blåstömningen inte blir fullständig. Därför behöver du innan behandlingen lära dig att tömma blåsan med hjälp av kateter (en tunn slang).

Effekten av Botox klingar av efter sex till åtta månader. Om du blir nöjd med resultatet kan behandlingen upprepas.

Förberedelse

Två veckor innan behandling lämnar du urinprov för odling. Om odlingen skulle visa bakterier får du antibiotika.

Alla får antibiotika i förebyggande syfte behandlingsdagen och ytterligare två dagar.

Hur går det till?

Du får antibiotikatablett på mottagningen på morgonen.

Urinblåsan töms och därefter fylls urinblåsan med ett lokalbedövningsmedel. När bedövningen verkat sprutar läkaren Botox i urinblåsans vägg via ett cystoskop med kamera. När behandlingen är klar kan du åka hem.

Efteråt

Det är inte ovanligt med lite blod i urinen under några dagar efteråt.

Om du inte är säker på att du tömmer urinblåsan fullständigt, kontrollerar du med hjälp av kateter två gånger om dagen. Det skall finnas mindre än 150 ml urin i blåsan efter att du varit på toaletten. Var observant på tecken till urinvägsinfektion (sveda, urinträngningar och feber). Vänd dig vid behov till Uroterapiavdelningen.

Hur länge sitter effekten i?

Effekten av behandlingen kommer vanligtvis efter två till sju dagar och sitter i mellan sex till åtta månader. När effekten har upphört kan du höra av dig till vår mottagning för ny behandling. I väntan på den kan du återgå till att ta de tabletter du hade innan du behandlades med Botox.

Uppföljning

Du kommer att få telefonkontakt med uroterapeut en till två veckor efter behandlingen för att kontrollera behandlingseffekten, eventuella blåstömningssvårigheter och behov av tappning med kateter samt tecken på urinvägsinfektion.