

Patientinformation

Till dig som valt att göra den medicinska aborten hemma

Du har av oss fått de läkemedel som du behöver för att fullfölja behandlingen samt läkemedel mot smärta. För att metoden ska lyckas är det mycket viktigt att du tar läkemedlen även om du redan har börjat blöda.

Det är viktigt att du har någon hos dig och att du har möjlighet att ta dig till sjukhuset om du skulle behöva detta. Glöm inte att äta dina måltider som vanligt.

Behandlingsdagens morgon:.....

De tabletter som du intar ska inte tas på fastande mage så börja med att **äta frukost**.

1. Kl2 tabletter **Brufen Retard à 800 mg** + 2 tabletter **Alvedon à 500 mg**.
2. Kl4 tabletter **Cytotec** läggs så långt in i slidan som du kan nå.
3. Kl2 tabletter **Cytotec** läggs så långt in i slidan som du kan nå.
4. Annan smärtlindring vid astmabesvär eller allergi.....

Det är viktigt att **du vilar 1 timma** efter det att du lagt in tabletterna i slidan. De kan annars åka ut till exempel vid toalettbesök.

Om du får ont

Du kan vid behov fortsätta ta 2 tabletter **Alvedon à 500 mg** var 6:e timme.

Ta eventuellt vid behov 1 tablett **Brufen Retard 800 mg**.

Hjälper inte detta på någon timme tar du 1 kapsel **OxyNorm**.

Värmedyna eller varm dusch kan ha bra smärtlindringseffekt.

Vid fortsatt smärta ring till nedan angivna telefonnummer.

Läkemedlen måste förvaras utom räckhåll för barn.

Maxdos/dygn för tablett Brufen Retard är 2 400 mg = 3 tabletter.

Maxdos/dygn för tablett Alvedon är 4 g = 8 tabletter.

Behöver du akut läkarvård skall du söka på gynekologmottagning på NÄL

Öppettider: måndag - torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00-15.00.

Telefonnummer 010-435 22 00, knappval 3, 2.

(Övrig tid hänvisas till akutmottagning, NÄL, ring via växeln 010-435 00 00.)

För övrig rådgivning kvällar och helger, ring **Sjukvårdsupplysningen**,
telefonnummer 1177

Om du, i samband med din behandling, vill komma i kontakt med

Någon att prata med

Kvinnoklinikens kurator - NÄL kuratorsexpedition, telefonnummer 010-435 53 80