



## Patientinformation

# Medicinsk abort med utökad uppföljning av graviditetshormon

Vid undersökning kunde läkare/barnmorska inte säkerställa att graviditeten sitter i din livmoder. Den vanligaste orsaken till detta är att graviditeten är för tidig för att kunna ses med ultraljud. I cirka 2 – 3 % av alla graviditeter fäster det befruktade ägget på fel plats, oftast i äggledaren istället för i livmodern. Tillståndet kallas för utomkvedshavandeskap/extrauterin graviditet. Det är en graviditetskomplikation som kan kräva akut vård i de fall äggledaren brister och en blödning uppstår i buken när graviditeten växer.

Du som inte har några symtom på utomkvedshavandeskap kommer att genomgå den medicinska aborten som planerat, men kommer att behöva utökad uppföljning eftersom medicinsk abort inte avbryter en graviditet som fäst på fel ställe.

Ett blodprov (hCG = graviditetshormon) tas när du startar den medicinska aborten. Efter en vecka görs en uppföljning med ett nytt blodprov, detta blodprov du kan lämna på din vårdcentral.

**Du ska ta ditt blodprov den \_\_\_\_\_**

De båda provsvaren kommer att jämföras. Om halten av graviditetshormon inte sjunker, behövs en ny gynekologisk undersökning och eventuellt en annan medicinsk behandling eller operation.

Då vi kan behöva komma i kontakt med dig vill vi att du är nåbar på angivet telefonnummer dagarna efter din provtagning.

Om du skulle få nytillkommen buksmärta/smärta på ena sidan i magen eller nedsatt allmäntillstånd är det viktigt att du kontaktar sjukvården direkt.

## Kontakt

Vid frågor kontakta Gynekologiska mottagningen, NÅL

Telefon: 010-435 22 00