

## Patientinformation

# Till dig som ska genomföra medicinsk behandling med peroralt Cytotec i hemmet

Det är viktigt att du har någon hos dig när du gör behandlingen hemma och att du har möjlighet att ta dig till sjukhuset om du skulle behöva detta. Glöm inte att äta dina måltider som vanligt. Behandlingen startas ofta i anslutning till det läkarbesök där man funnit att det finns kvar graviditetsrester i livmodern. Bäst är om behandlingen genomförs så tidigt som möjligt under dagen.

Du har av oss fått de läkemedel som du behöver för att fullfölja behandlingen samt läkemedel mot smärta.

1. En timma innan den medicinska behandlingen tar du 2 tabletter **Brufen Retard à 800 mg** + 2 tabletter **Paracetamol à 500 mg**.
2. Efter en timma
  - Sväljer du 3 tabletter **Cytotec**
  - Läger du 2 tabletter **Cytotec** under tungan

## Om Du får ont

Du kan vid behov fortsätta ta 2 tabletter **Paracetamol** var 6:e timme.

Ta eventuellt vid behov 1 tablett **Brufen Retard 800 mg**.

Hjälper inte detta på någon timme tar du 1 kapsel **OxyNorm**.

Värmedyna eller varm dusch kan ha bra smärtlindringseffekt.

Vid fortsatt smärta ring nedan angivna telefonnummer.

## Läkemedlen måste förvaras utom räckhåll för barn.

Maxdos/dygn för tablett Brufen Retard är 2 400 mg = 3 tabletter.

Maxdos/dygn för tablett Paracetamol är 4 g = 8 tabletter.

**Behöver du akut läkarvård ska du söka på Gynekologisk mottagning på NÄL**

Öppettider: måndag - torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00-15.00.

Telefonnummer **010-435 22 00, knappval 1, 2.**

(Övrig tid hänvisas till akutmottagning, NÄL, ring via växeln 010-435 00 00.)

För övrig rådgivning kvällar och helger, ring **Sjukvårdsupplysningen**,  
telefonnummer 1177

Om du, i samband med din behandling, vill komma i kontakt med

**Någon att prata med**

Kvinnoklinikens kurator - NÄL kuratorsexpedition, tel. 010-435 53 80