



Patientinformation

Till dig som ska opereras med slyngkonisering i lokalbedövning

Cellförändringar på livmodertappen är vanligt. Behandling innebär att förändringen på livmodertappen tas bort med hjälp av en slynga. Ingreppet utförs i lokalbedövning på Gynekologmottagningen, NÄL.

Förberedelse

Ta 1 gram paracetamol (till exempel Alvedon 500 mg, 2 styck) hemma.

Ingreppet

Gynekologen undersöker livmodertappen med hjälp av ett mikroskop. Bedövning med hjälp av en tunn spruta och när bedövningen verkat tas förändringen bort med en specialformad tråd (slynga).

Operationen tar cirka 10 minuter. Om du vill kan du ha med dig din telefon och hörlurar och lyssna på något under operationen.

Eftervård

Efter operationen stannar du på mottagningen en halvtimme till en timma för att övervaka eventuell blödning.

Blödning/flytning

I regel en mensliknande blödning under en till två dagar och därefter brunröd flytning under två till tre veckor. Ibland kommer en kraftigare blödning efter 10 – 14 dagar, vilket är helt normalt. Sårskorpan som bildats på livmodertappen kan då ha lossnat.

Använd inte tampong eller menskopp så länge som du blöder eller har riklig flytning. Vid eventuell riklig blödning tag Cyklo-F (köps receptfritt på apotek) 2 tabletter 4 gånger dagligen. Om blödningen trots detta är fortsatt riklig ska du kontakta Gynekologmottagningen.

Smärta

För smärtlindring kan du i första hand använda värktabletter med paracetamol och ibuprofen som du kan köpa receptfritt på apotek. Det är vanligt med mensvärksliknande besvär efter behandlingen, detta försvinner efter någon vecka.

Bad/dusch

Avstå från bad så länge flytningen är missfärgad, det vill säga cirka tre veckor. Duscha går bra.

Aktivitet

Undvik kraftig fysisk ansträngning de första dagarna efter behandlingen.

Samliv

Avstå från samlag de första fyra veckorna efter behandlingen.

Sjukskrivning

Behövs i regel inte men om du har ett arbete som innebär många tunga lyft rekommenderar vi att du avstår arbete i några dagar.

Återbesök

Du får ett brevbesked om resultatet och när du ska komma för återbesök. Återbesök sker inom sex månader efter operationen och då tas ett cellprov.

Problem

Vid ökad smärta, illaluktande flytning, feber eller andra besvär, kontakta Gynekologmottagningen, NÄL.

Kontakt

Telefon 010-435 22 00

Telefontid: måndag – fredag kl. 08.00 – 11.30
 måndag, tisdag, torsdag kl. 13.00 – 15.00