



Patientinformation

Smärtlindring efter operation

OxyNorm OxyContin

Förutom grundsmärtlindring med receptfritt paracetamol- och ibuprofenpreparat har din läkare ordinerat:

OxyNorm

Är ett starkt smärtstillande och morfinliknande läkemedel, som kan kombineras med grundsmärtlindringen. Första dygnet efter operation kan du behöva ta starkare smärtstillande läkemedel för att undvika svår smärta.

Din läkare har ordinerat ett begränsat antal OxyNorm-tabletter.

Dosering: 1 tablett OxyNorm á 5 mg vid behov.

- OxyNorm har effekt i 6 timmar. Du bör helst vänta 6 timmar innan du tar ytterligare en tablett OxyNorm.
- Tabletter får du med från avdelningen.
- OxyNorm påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil eller inta alkohol om du tagit läkemedlet.
- Läkemedlet påverkar tarmrörligheten och kan ge förstoppning och illamående. Läkemedlet kan kombineras med Laxantia. Fråga på apoteket efter lämpligt läkemedel.

OxyContin

Är ett starkt smärtstillande och morfinliknande läkemedel, som kan kombineras med grundsmärtlindringen. Första dygnet efter operation kan du behöva ta starkare smärtstillande läkemedel för att undvika svår smärta.

Din läkare har ordinerat ett begränsat antal OxyContin-tabletter.

Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen.

- OxyContin har smärtstillande effekt i cirka 12 timmar.
- Tabletter får Du med från avdelningen.

- OxyContin påverkar reaktionsförmågan och vakenheten. Kör inte bil eller inta alkohol om du tagit läkemedlet.
- Läkemedlet påverkar tarmrörligheten och kan ge förstoppning och illamående. Läkemedlet kan kombineras med Laxantia. Fråga på apoteket efter lämpligt läkemedel.

Kontakt

Sjuksköterska Avdelning 35 NÄL
Telefonnummer 010- 435 03 50