



## Patientinformation

# Till dig som ska opereras med slyngkonisering på Operationsavdelningen NÄL

Cellförändringar på livmodertappen är vanligt. Behandling innebär att förändringen på livmodertappen tas bort med hjälp av en slynga eller laser. Ingreppet utförs på Operationsavdelningen, NÄL.

## Läkemedel inför din operation

Läkemedel som ökar blödningsrisk inför din operation

- NSAID (till exempel Brufen, Naproxen, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Artotech) ska du sluta med 3 dygn innan operationen.
- Acetylsalicylsyra i högre doser (500 mg eller mer), till exempel Treo, Bamyf, Magnecyl ska du sluta med 7 dagar före operationsdagen.

Äter du andra läkemedel som påverkar din blödningsrisk, till exempel Waran, Pradaxa, Eliquis, Brilique, kommer du få särskild information om hur du ska göra med dessa läkemedel av din ansvarige läkare.

## Ingreppet

Ta 1,5 g paracetamol (exempelvis Alvedon 500 mg, 3 styck) hemma på morgonen. Förändringen på livmodertappen kan skäras ut med en specialformad tråd (slynga) som värms upp av ström. Förändringen kan också skäras bort med laser. Operationen tar 10 minuter.

## Eftervård

Du stannar en halvtimme till en timma efter operationen på Uppvakningsavdelningen.

### Blödning/flytning

I regel en mensliknande blödning under en till två dagar och därefter brunröd flytning under två till tre veckor. Använd inte tampong eller menskopp så länge du blöder eller har riklig flytning. Vid eventuell riklig blödning tag Cyklo-F (köps receptfritt på apotek)

2 tabletter 4 gånger dagligen. Om blödningen trots detta är fortsatt riklig skall du kontakta Gynekologmottagningen.

### **Bad/dusch**

Avstå från bad så länge flytningen är missfärgad, cirka tre veckor. Duscha går bra.

### **Aktivitet**

Inga begränsningar.

### **Samliv**

Avstå från samlag så länge flytningen är missfärgad.

### **Sjukskrivning**

Behövs i regel inte.

### **Återbesök**

Du får ett brevbesked om resultatet och när du skall komma för återbesök.

Återbesök sker inom fyra till sex månader efter operationen och då tas ett cellprov.

### **Problem**

Vid ökad smärta, illaluktande flytning, feber eller andra besvär, kontakta Gynekologmottagningen, NÄL.

## **Kontakt**

Telefon 010-435 22 00

Telefontid:   måndag – fredag           kl. 08.00 – 11.30  
                  måndag, tisdag, torsdag   kl. 13.00 – 15.00