Patientinformation

Inför operation av blåshalsförträngning

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Den del av prostatavävnaden som omger blåshalsen kan växa till och ge upphov till en förträngning. Symtomen liknar de vid prostataförstoring och innebär att vattenkastningen försvåras eftersom urinröret pressas samman.

Operation

Ingreppet utförs under ryggbedövning eller i narkos.
Operationen utförs med ett instrument via urinröret. Det liknar det instrument man använder vid inspektion av urinblåsan - cystoskopi. Med hjälp av en elektriskt ledad slynga bränner man av vävnad, delar den inre slutmuskeln och delar även prostatakörteln vilket skapar en större öppning in mot blåsan.

Efter operation

Efter operationen läggs oftast en kateter in i blåsan. Den får sitta tills dagen efter. Katetern dras sedan på avdelningen eller av distriktssköterskan på din vårdcentral.
Ibland kan det blöda en del efter ingreppet och då är det bra om Du dricker extra mycket. På så sätt spolas blodet ut och förhindras koagulera i blåsan och katetern. Även när katetern är dragen kan Du se blod i urinen och det är bra att en tid fortsätta dricka lite extra.

Första tiden hemma

Första tiden är det ofta irriterat i blåsan och det brukar innebära täta besök på toaletten. Det går för det mesta över på några dagar.

Infektion kan inträffa i efterförloppet. Det visar sig då med samma symtom som vanlig blåskatarr. Vid misstanke om infektion bör läkare rådfrågas.

Det är bra att inte lyfta tungt eller krysta på toaletten de första veckorna efter operation då detta kan medföra en blödning från det nyopererade området.

Man bör heller inte cykla den första tiden.

Ett par veckor efter ingreppet kan en ”efterblödning” uppstå då den sårskorpa som bildats i operationsområdet släpper. Detta är helt ofarligt om inte blödningen blir riklig eller orsakar urinstopp.

Efter operationen händer att sädesvätskan vid samlag inte kommer via urinröret som vanligt utan tömmer sig i blåsan och blandas med urinen. Detta är helt ofarligt men kan ha betydelse om man fortfarande vill kunna få barn – i så fall är denna operation olämplig. Man kan dock inte räkna med att vara helt steril och bör därför fortsätta använda preventivmedel om man inte önskar få barn.

Kontakta oss

Urologimottagning
Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla
Besöksadress Fjällvägen 9, Uddevalla

Har du frågor angående din operationstid ringer du vår operationskoordinator, tel. 010-435 00 36

Har du frågor inför undersökningen ringer du urologimottagningen, tel. 010-435 40 50

www.nusjukvarden.se