

Patientinformation

Operation av tumör i urinblåsan - slutenvård



Urinblåsans insida täcks av en slemhinna. Överallt i denna slemhinna kan förändringar uppstå. Urinblåsetumörer är vanliga, men dess orsak är ännu inte helt känd. Man vet dock att rökare löper högre risk att drabbas. Det vanligaste symtomet är blod i urinen.

Inför operation

Före operation ges en fullständig bedövning antingen via ryggbedövning eller narkos. Ibland behöver man spruta ett färgämne i urinblåsan som gör det lättare att hitta förändringar i urinblåsan, detta sker som regel en timme innan operation.

Operation

Operationen sker med ett instrument via urinröret under narkos. Själva instrumentet liknar det som används på mottagningen vid inspektion av blåsan – cystoskopi. Det är dessutom försett med en elektriskt ledande metallslynga som används för att skära eller bränna bort förändringen. Ingreppet tar i allmänhet 30–45 minuter.

Inskrivning

I samband med mottagningsbesöket tas blodprover och eventuellt EKG. Efter detta får du träffa en planerings- sjuksköterska och eventuell en narkosläkare för samtal, narkosbedömning och ytterligare information inför ingreppet, eventuellt kan samtalet med narkosläkaren ske vid senare tillfälle. Du får en tid för operationen och du kommer vanligtvis på operationsdagens morgon till vårdavdelning 3, våning 3.

Efter operation

Efter operationen får du som regel lite blod i urinen under några dagar, möjligtvis får du en kateter in i blåsan. Den får dras bort på kvällen eller dagen efter.

Några timmar efter ingreppet ligger du kvar på uppvaknings- avdelningen. Där finns större möjligheter för övervakning och vid behov spolning av urinblåsan via den inlagda katetern. Spolningen är nödvändig för att förhindra att blodet lever sig.

Utskrivning

Vid utskrivningen från vårdavdelningen får du vad vi kallar ett utskrivningsmeddelande, i det sammanfattar vi operationen och vidare planering. Planeringen brukar vara att avvakta mikroskopiska undersökningsresultatet på vävnaden som togs från urinblåsan under operation, därefter en kallelse till en ny besiktningundersökning av urinblåsan tre månader efter operation.

Behovet av sjukskrivning sker från fall till fall.

Första tiden hemma

I efterförloppet är det vanligt med sveda i urinröret och tätare trängningar. Detta upphör oftast efter någon/några dagar. Blod i urinen kan också förekomma några dygn efter operation. Detta är inte onormalt eller farligt.

Skulle blödningen dock bli riklig eller ge urinstopp måste du uppsöka sjukhus.

De närmaste två veckorna efter operation bör du vara försiktig med att lyfta tungt, spänna magmusklerna hårt och krysta på toaletten. Detta kan framkalla en blödning från såret i blåsan. Har du lätt att få förstoppning är det bra om du tänker på kosten och försöker dricka extra mycket.

Infektion kan inträffa efter operationen, och visar sig då med samma symtom som vanlig blåskatarr – det vill säga ökade trängningar och sveda i urinröret. Vid misstanke om infektion bör läkare rådfrågas då antibiotikabehandling kan bli nödvändig.

Kontakta oss

Om du har frågor inför ingreppet, kontakta Urologimottagningen:
010-435 40 50.

Om du har frågor angående din operationstid, kontakta
operationskoordinator: **010-435 00 36.**

Välkommen!

Urologimottagningen
Uddevalla sjukhus