

Patientinformation

Operation av tumör i urinblåsan - öppenvård



Urinblåsans insida täcks av en slemhinna. Överallt i denna slemhinna kan förändringar uppstå. Urinblåsetumörer är vanliga, men dess orsak är ännu inte helt känd. Man vet dock att rökare löper högre risk att drabbas. Det vanligaste symtomet är blod i urinen.

Inför operation

Före operation ges en fullständig bedövning, antingen via ryggbedövning eller narkos. Ibland behöver man spruta ett färgämne i urinblåsan som gör det lättare att hitta förändringar i urinblåsan, detta sker som regel en timme innan operation.

Operation

Operationen sker med ett instrument via urinröret under narkos. Själva instrumentet liknar det som används på mottagningen vid inspektion av blåsan – cystoskopi. Det är dessutom försett med en elektriskt ledande metallslynga som används för att skära eller bränna bort förändringen. Ingreppet tar i allmänhet 30–45 minuter.

Efter operation

Efter operation stannar du på uppvakningsavdelningen ett par timmar.

Du får som regel en liten blödning efter ingreppet, därför läggs en kateter in i blåsan. Detta för att säkerställa att du kan tömma blåsan och för att kunna spola rent från den blödning som är vanlig de första timmarna. I de flesta fall tas katetern bort innan du går hem.

Utskrivning

Du får åka hem några timmar efter operationen och då får du ett utskrivningsmeddelande. I det sammanfattar vi operationen och vidare planering. Planeringen brukar vara att avvakta det mikroskopiska undersökningsresultatet på vävnaden som togs från urinblåsan under operation, därefter får du en kallelse till en ny besiktningsundersökning av urinblåsan tre månader efter operation. Behovet av sjukskrivning sker från fall till fall.

Första tiden hemma

I efterförloppet är det vanligt med sveda i urinröret och tätare trängningar. Detta upphör oftast efter någon/några dagar. Blod i urinen kan också förekomma några dygn efter operation. Detta är inte onormalt eller farligt.

Skulle blödningen dock bli riklig eller ge urinstopp måste du uppsöka sjukhus.

De närmaste två veckorna efter operation bör du vara försiktig med att lyfta tungt, spänna magmusklerna hårt och krysta på toaletten. Det kan framkalla en blödning från såret i blåsan. Har du lätt att få förstoppning är det bra om du tänker på kosten och försöker dricka extra mycket.

Infektion kan inträffa efter operationen, och visar sig då med samma symtom som vanlig blåskatarr – det vill säga ökade trängningar och sveda i urinröret. Vid misstanke om infektion bör läkare rådfrågas då antibiotikabehandling kan bli nödvändig.

Kontakta oss

Om du har frågor inför ingreppet, kontakta Urologimottagningen:
010-435 40 50.

Om du har frågor angående din operationstid, kontakta operationskoordinator: **010-435 00 36.**

Välkommen!

Urologimottagningen
Uddevalla sjukhus