

Patientinformation

Inför operation av blåssten - slutenvård



Stenar i urinblåsan uppkommer ibland av små njurstenar som via urinledaren nått blåsan. Flertalet stenar följer omärkligt med urinen ut men en sten som ligger kvar i blåsan kan bli som en kärna kring vilken urinens salter fälls ut och den ökar i storlek. Prostataförstoring med sämre avflöde från blåsan ökar risken för stenbildning speciellt om man samtidigt har problem med urinvägsinfektioner. Även långvarig behandling med urinkateter kan ge avlagringar från slangen så att sten bildas.

Ännu finns inga bevis för att speciell diet eller medicin skulle kunna förebygga stenbildning.

Operation

Ingreppet sker via urinröret med ett instrument av samma typ som används vid inspektion av urinblåsan – cystoskopi. Stenen/stenarna krossas med tång eller laser och bitarna spolats ut. Ingreppet sker under full bedövning, antingen med ryggbedövning eller narkos. Vilken typ av bedövning som blir bäst för Dig bestämmer Du tillsammans med narkosläkaren vid inskrivningen.

I vissa fall är stenen/stenarna så stora att de måste avlägsnas genom öppen operation – man går in via buken och öppnar blåsan. Vilken typ av operation Du ska genomgå har Du fått information om då Du sattes på väntelista.

Inskrivning

Inskrivningsdagens morgon tas blodprover och eventuellt EKG. Du får sedan träffa avdelningsläkaren, sjuksköterska och narkosläkare för samtal och information inför ingreppet.

Efter operation

Efter ingreppet får man som regel en liten blödning, därför läggs en kateter in i blåsan som får ligga kvar något dygn. De första timmarna ligger Du kvar på Uppvakningsavdelningen där övervakning och eventuell spolning av urinblåsan via katetern sker.

Spolning kan vara nödvändig för att blodet inte ska levara sig – koagulera. Katetern dras senare på vårdavdelningen.

Utskrivning

Vid utskrivningen bestäms om efterkontroll behövs och i så fall ungefär när. Kallelse för detta får Du från urologmottagningen. Behov av sjukskrivning bedöms från fall till fall.

Första tiden hemma

Urinen är ofta blodtillblandad flera dygn efter ingreppet vilket inte är farligt. Vid riklig blödning och svårighet att kasta vatten bör man dock uppsöka sjukhus. Ofta svider det också i urineröret något/några dygn efter operationen. Det är bra att dricka lite extra för att på så sätt spola rent i blåsan.

Infektion kan inträffa i efterförloppet. Detta visar sig då med samma symtom som vid blåskatarr – ökade trängningar och sveda. Urinen kan också lukta illa och vara missfärgad eller grumlig. Vid misstanke om infektion bör läkare rådfrågas då antibiotikabehandling kan bli aktuell.

Kontakta oss

Urologimottagning

Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla

Besöksadress Fjällvägen 9, Uddevalla

Har du frågor angående din operationstid ringer du vår
operationskoordinator, tel. 010-435 00 36

Har du frågor inför undersökningen ringer du
urologimottagningen, tel. 010-435 40 50

www.nusjukvarden.se