

Patientinformation

Inför operation av blåssten - öppenvård



Stenar i urinblåsan uppkommer ibland av små njurstenar som via urinledaren nått blåsan. Flertalet stenar följer omärkligt med urinen ut men en liten sten som ligger kvar i blåsan kan bli som en kärna kring vilken urinens salter fälls ut och den ökar undan för undan i storlek.

Prostataförstoring med försämrat avflöde från blåsan ökar risken för stenbildning speciellt om man samtidigt har problem med urinvägsinfektioner. Även vid långvarig behandling med urinkateter kan avlagringar från slangen ge upphov till stenar.

Ännu finns inga bevis för att speciell diet eller medicin skulle kunna förebygga stenbildning

Operation

Ingreppet sker via urineröret med ett smalt instrument av samma typ som används vid inspektion av urinblåsan – cystoskopi.

Stenen/stenarna krossas med en tång eller med hjälp av laser och bitarna spolats ut. Operationen sker under full bedövning, antingen med hjälp av ryggbedövning eller narkos. Vilken typ av bedövning som blir bäst för Dig bestämmer Du tillsammans med narkosläkaren när Du kommer till sjukhuset. Ibland kan operationen också göras i lokalbedövning som vid cystoskopiundersökning.

Ingreppets längd beror på hur många och hur stora stenarna är, vanligen dock 30 – 60 minuter.

Efter operation

Du ligger kvar på Uppvakningsavdelningen ett par timmar där man ser att bedövningen släpper, att Du mår bra och kan kasta vatten. Ibland sätts en kateter in i blåsan för att spola rent timmarna efter ingreppet. Den dras i regel innan hemgång.

Hemgång

Om återbesök krävs får Du besked om detta innan Du lämnar sjukhuset.

Första tiden hemma

Urinen är ofta blodtillblandad flera dygn efter operationen

vilket inte är farligt. Det är bra att dricka extra mycket för att på så sätt spola rent blåsan. Vid riklig blödning och svårigheter att kasta vatten måste man dock uppsöka sjukhus.

Oftast svider det i urinröret de första gångerna man kastar vatten efter ingreppet.

Infektion kan inträffa i efterförloppet. Detta visar sig då med samma symtom som vid blåskatarr – det vill säga ökade trängningar och sveda i urinröret. Urinen kan också lukta illa och vara missfärgad eller grumlig. Vid misstanke om infektion bör läkare rådfrågas.

Kontakta oss

Urologimottagning

Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla

Besöksadress Fjällvägen 9, Uddevalla

Har du frågor angående din operationstid ringer du vår
operationskoordinator, tel. 010-435 00 36

Har du frågor inför undersökningen ringer du
urologimottagningen, tel. 010-435 40 50

www.nusjukvarden.se