



## Patientinformation

# Information till dig som ska få dold urinledarkateter – pigtailkateter

Urinledarkatetern är en mjuk böjlig plastkateter som placeras mellan njuren och urinblåsan. Dold innebär att den inte syns på utsidan. Det finns flera situationer då en urinledarkateter behövs. Några vanliga är:

- För att häva ett stopp i urinledaren orsakat av bl. a en sten.
- För att säkerställa urinpassage då behandling av stor njursten skall utföras.
- För att skydda urinledaren under läkningsprocessen efter kirurgiskt ingrepp i urinledaren.

Även andra orsaker finns. Ytterligare information får du av din läkare.

## Inläggning av pigtailkateter

Ett smalt instrument (cystoskop) förs in till urinblåsan genom urinröret. Genom instrumentet träs den tunna katetern upp till njuren. När katetern ligger på plats bildar den en knorr i var ände som gör att den ligger kvar i rätt läge. Urinen har nu fri passage till blåsan.

I många fall kan detta utföras under lokalbedövning, annars får du en kort narkos. Du får stanna några timmar på Uppvakningsavdelningen där man kontrollerar att du mår bra och kan tömma blåsan som vanligt.

Ev behov av sjukskrivning bedöms från fall till fall.

## Hur länge ska du ha din kateter?

Beror naturligtvis på varför du fått den. Information om detta får du av din läkare. Observera dock att katetrar i urinledare inte kan kvarligga hur länge som helst.

Katetern tas vanligen bort via en cystoskopi (se inläggning). I vissa fall har katetern en tunn utdragstråd som löper ut genom urinröret. Genom att dra i tråden kan urinkatetern enkelt avlägsnas.

## Första tiden hemma

Många känner inte av katetern medan andra kan känna en viss smärta/obehag i sidan och då särskilt i samband med toalettbesök. Ibland kan det också bli lite blodtillblandad urin. Inget av detta är farligt.

Det är viktigt att ha ett bra urinflöde varför man bör dricka minst 1.5 liter per dag om läkare inte ordinerat annat.

## Arbete, sport och aktiviteter

Om du inte har ett tungt arbete går det i de flesta fall bra att arbeta som vanligt. Sporter med fysisk kroppskontakt eller uttalade kroppsrörelser bör undvikas då detta kan rubba kateterläget.

Katetern utgör inget hinder för samlag. Finns utdragstråd bör män använda kondom.

## Speciellt att tänka på

Katetern kan falla ut men detta är sällsynt. Kontakta i så fall din urologmottagning. Om du känner dig sjuk och får feber, buk/ryggsmärtor eller kraftig sveda vid vattenkastning ska du också kontakta din urologmottagning eller läkare. Under helger och kvällar kontaktar du närmaste akutmottagning. Detsamma gäller om urinen blir kraftigt blodtillblandad.

## Kontakt

Har du ytterligare frågor inför ingreppet kan telefontid till din läkare beställas på följande nummer:

**Kirurgkliniken/urologmottagningen**

**NU-sjukvården**

010-435 40 50

Har du frågor angående din operationstid kan du kontakta operationskoordinatörn.

**Operationskoordinator**

010-435 00 36 – dagtid

Mina vårdkontakter

[www.nusjukvarden.se](http://www.nusjukvarden.se)