

Patientinformation/anvisning inför undersökning av ändtarm med rektoskopi

Rektoskopi innebär att ändtarmen undersöks med en rörformad kikare, ett så kallat rektoskop. Detta görs för att se om det finns sjukliga förändringar i ändtarmen, till exempel hemorrojder, tumörer, polyper eller inflammationer.

Förberedelse inför rektoskopi, tömning av ändtarmen

För att läkaren ska kunna undersöka din ändtarm måste denna vara fri från skyddande innehåll. MICROLAX inhandlas på Apoteket. Läs bipacksedeln!

- **Ta 1 tub Microlax kvällen innan besöket**
OCH
- **Ta 1 tub Microlax cirka 2 timmar innan besöket**

Du kan äta och dricka som vanligt före och efter denna undersökning.

Så här går rektoskopiundersökningen till

Undersökningen tar cirka 5-10 minuter av ditt läkarbesök. Rektoskopet är ett smalt, ihåligt plaströr försett med en ljuskälla och ett förstoringsglas som hjälper läkaren att se tarmen ordentligt. På undersökningsrummet får du ta av dig på underkroppen och lägga dig på en undersökningsbänk, oftast på vänster sida med benen uppdragna mot magen. Innan rektoskopet förs in undersöker läkaren ändtarmsöppningen med ett finger. Rektoskopet smörjs in med glidmedel och förs in i tarmen. Tarmen vidgas försiktigt genom att luft förs in via en ballong för att läkaren ska kunna se tarmens insida. Luften upplevs som en spänningskänsla lik den vid tarmtömning. Genom röret kan man också föra in de instrument som behövs för provtagning.

Medicinerar du med något blodförtunnande medel?

Till exempel Waran, Eliquis, Lixiana, Brilique, Xarelto, Predaxa, Clopidogrel. Isåfall är det viktigt att du meddelar kirurgmottagningen detta.

Med vänlig hälsning

Kirurgmottagningen/nedre gastroteamet

Tfn 010-435 34 00, knappval 2.

Du kan ringa från kl 7:30 och får då en återuppringningstid till oss.