

Patientinformation Angio PCI NÄL via väntelista

Information om kranskärlsröntgen och ev. kranskärlsvidgning

Detta är information till dig som ska genomgå en kranskärlsröntgen.

Via 1177 finns ytterligare information om kranskärlsröntgen under fliken Undersökning och behandling/undersökningar och provtagning/röntgen och bildundersökningar – kranskärlsröntgen.

Du har fått tid för kranskärlsröntgen på Hjärtcentrum, Kardiologkliniken NU-sjukvården.

Har du blodförtunnande läkemedel i form av **Waran** ska du senast veckan före ingreppet ta kontakt med din AK-mottagning

Det kan finnas olika anledningar till att en kranskärlsröntgen utförs: kärlkramp, utredning inför en eventuell hjärtoperation till exempel klaffbyte, vid en hjärtsviktsutredning eller inför andra planerade operationer.

På undersökningdagen

Ta din morgonmedicin, men inte dina vätskedrivande läkemedel. Har du diabetes och behandlas med Metformin eller Glukophage får du inte ta dessa på behandlingsdagen samt de 2 följande dagarna efter kranskärlsröntgen.

Om du behandlas med Trombyl/Acetylsalicylsyra/Efient/Brilique/Plavix/Clopidogrel ska du ta det som vanligt.

Behandlas du med Eliquis (Apixaban), Pradaxa (Dibigatranetixilat, Lixiana (Edoxaban) eller Xarelto (Rivaorxaban) ska du inte ta den på morgonen undersökningdagen. Fortsätt att ta den på kvällen efter undersökningen.


- Ät frukost som vanligt. Du får inte använda tobak, inklusive snus.
- Duscha hemma som vanligt med tvål och hårschampo innan du kommer till sjukhuset.
- Du har fått en preliminär tid, vilket innebär att din undersökning kommer att ske under den aktuella dagen. Var beredd på att väntetid kan uppstå då det pågår akut verksamhet samtidigt.
- Ta gärna med något att läsa, då väntetiden ibland kan kännas lång.
- Om du behandlas för någon annan sjukdom än för dina hjärtproblem, ta med dig dina mediciner för detta.
- Lämna värdesaker och pengar hemma

Kranskärlsröntgen

Före ingreppet får du en droppslang i armen. På undersökningsbordet blir du steriltvättad runt handleden eller i ljumsken. Därefter klär vi in dig i sterila dukar. Efter att bedövning givits på stickstället och ev. lugnande eller smärtstillande läkemedel, förs en tunn kateter via ett blodkärl i armen eller ljumsken upp till hjärtat. Detta kan ibland medföra obehag, framför allt vid undersökning genom blodkärl i armen. Kontrastmedel ges för att se om det finns några förträngningar i hjärtats kranskärl. Om förträngningarna bedöms lämpliga att åtgärda med ballongvidgning, så kallad PCI görs det ofta på en gång. Ibland bedömer hjärtläkaren att bästa åtgärd är medicinsk behandling eller att kranskärlen behöver åtgärdas vid en thoraxkirurgisk operation (bypassoperation).

Ballongvidgning

Om kranskärlsröntgen visar behandlingskrävande förträngningar kan det bli aktuellt med ballongvidgning vid samma tillfälle. Via katetern som förts in i hjärtats kranskärl vidgas förträngningen med en ballong och ett stent (metallnät) implanteras (läggs in). Stentet minskar risken för att förträngningen kommer tillbaka. Under proceduren kan du uppleva viss bröstsmärta. Du får smärtstillande eller lugnande läkemedel.



Efter ingreppet

Du kommer att ha ett tryckförband över instickstället i minst 4 timmar efter ingreppet. Du får vara uppe och gå direkt efter om ingreppet gjorts via handleden. Tänk på att hålla armen i högläge.

Undvik tunga lyft de första dagarna efter ditt ingrepp oavsett om ingreppet gjorts via handleden eller ljumsken.

Om ingreppet gjorts via ljumsken behöver du ligga stilla några timmar efteråt.

Utskrivning sker oftast samma dag som undersökningen, ibland vid PCI stannar man över till dagen efter. Utskrivning sker då under förmiddagen. Du bör inte köra bil hem.

Efter ballongvidgning får du en tid till hjärtrehabsköterska inom ca 2 veckor och återbesök till läkare efter ca 3 månader.

Komplikationer

Komplikationer i anslutning till ingrepp förekommer. Allvarliga komplikationer vid kranskärlsröntgen/PCI är dock ovanliga.

Ibland kan man få blodtrycksfall och eller känna oregelbunden hjärtrytm som snabbt går över.

Kärlkrampssmärta vid PCI (ballongvidgning) är relativt vanligt, det beror på att blodkärlet stängs tillfälligt av när ballongen trycks upp.

Blåmärken med en liten svullnad på och omkring stickställen förekommer ofta. Dagarna efter ingreppet kan man uppleva smärta i underarmen vid insticksstället

Kateterns spets kan orsaka lokala skador i sjuka och sköra kärl och komplikationer av större allvarlighetsgrad innefattar störningar i hjärtats och hjärnans blodcirkulation. Dessa är dock sällsynta och risken är <1 %.

Dataregister

Alla patienter som genomgår kranskärlsröntgen eller PCI (ballongvidgning) registreras i ett särskilt nationellt dataregister.

Vid frågor som inte kan vänta till undersökningdagen kan du ringa PCI sköterska vardagar 08:00-16:00 på telefonnummer 010-4350437.

Välkommen!