



Patientinformation

Etanercept (Benepali, Enbrel)

Förlaga från hudmottagningen, SU/Sahlgrenska sjukhuset

Läkemedelsform

Förfylld spruta Enbrel 25 milligram, förfylld spruta Enbrel 50 milligram.
Förfylld spruta Benepali 50 milligram

Vad är Etanercept?

Etanercept, är ett äggviteämne som har skräddarsyttts för att blockera aktiviteten hos en kemisk budbärare i kroppen som kallas tumörnekrosfaktor (TNF). Denna budbärare finns i höga halter hos patienter som har de sjukdomar som Etanercept används för att behandla. Genom att blockera TNF minskar inflammationen och sjukdomssymtomen. Etanercept används bland annat vid psoriasis, psoriasisartrit och reumatoid artrit.

När sätts behandlingen in?

Vid besvärlig psoriasis där annan behandling (tablettbehandling med exempelvis Methotrexate, Neotigason och Ciklosporin) inte räcker till.

Effekt

Effekten ses ofta efter 4–6 veckors behandling. Fortsatt förbättring kan förväntas under ytterligare några månader. En mycket god förbättring med minskad fjällning, tjocklek och rodnad av psoriasisfläckarna brukar ses, men alla utslag försvinner oftast inte. Samtidig smörjbehandling kan fortsätta så länge det behövs.

Dosering

Behandlingen ges i form av sprutor under huden (subkutan). Etanercept 50 mg ges 1 gång i veckan. Alternativt kan Etanercept 25 mg ges 2 gånger i veckan. Effekten bedöms efter 3 månaders behandling.

Ibland minskas dosen eller behandlingen avslutas men i de flesta fallen fortsätter behandlingen på obestämd tid. Etanercept kan kombineras med Methotrexate.

Kontroller

Före insättning av Etanercept sker blodprovstagning, lungröntgen och test för att utesluta latent tuberkulos. När du börjar med behandlingen får du lära dig att ta sprutorna själv under handledning av sjuksköterska. Under behandlingen kommer du på blodprovstagning och läkarbesök med jämna mellanrum. Det är mycket viktigt med dessa kontroller, så att eventuella biverkningar kan upptäckas.

Möjliga biverkningar

Många får inga obehag alls av behandlingen. Den vanligaste biverkan är reaktioner på injektionsstället, men dessa brukar upphöra inom någon månad. Infektioner kan förekomma (bland annat förkylning, luftrörskatarr, blåskatarr och hudinfektioner). Om du får halsont eller någon annan infektion med feber ska du avbryta behandlingen med Etanercept och kontakta Din läkare eller sjuksköterska. Ta alltid kontakt med mottagningen om du får några symtom du inte känner igen.

Graviditet

Kvinnor ska inte bli gravida under behandlingen. Etanercept avslutas den dagen man planerar att bli gravid.

Män kan fortsätta behandlingen om de planerar barn.

Amning

Etanercept får inte tas under amning.

Vid operationer

Inför planerad operation bör behandlingen med Etanercept vara utsatt 2 veckor före operation. Behandlingen kan som regel återupptas 1–2 veckor efter operation om inga komplikationer tillstöter.

Vaccinationer

Influensavaccination rekommenderas till alla under behandling med Etanercept. Ta kontakt med din vårdcentral för att få vaccinationen.

Vid alla sjukvårdskontakter – tala alltid om att Du behandlas med Etanercept!

Kontakt

Hudmottagningen

Uddevalla sjukhus

Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:

Måndag – Fredag: 07:30 – 08:00, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.