Patientinformation

Till dig som ska behandlas med Mycophenolate mofetil/Cellcept

Förlaga från hudmottagningen, SU/Sahlgrenska sjukhuset

Läkemedelsform

Tablett 500 milligram, kapsel 250 milligram samt lösning pulver 200 milligram/milliliter.

Vad är Mycophenolate mofetil/Cellcept?

Mycophenolate mofetil (mykofenolsyra) är ett läkemedel som främst används inom transplantationsmedicinen för att förhindra avstötning av transplanterade organ. Läkemedlet har en immundämpande effekt genom att förhindra celldelning av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter, vilket också är önskvärt vid vissa hudsjukdomar.

När sätts behandlingen in?

Det används vid behandling av bland annat autoimmuna blåssjukdomar, svårare former av atopiskt eksem med mera. Mykofenolsyra påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet.

Dosering

Behandlingen startas i regel med 500 milligram/dygn den första veckan och därefter sker en ökning med 500 milligram/vecka till önskad måldos, för hudsjukdomar ofta 2000–3000 milligram/dygn fördelat på 2 doser.

Kapslarna ska inte öppnas och tabletterna inte krossas då beredningen inte får inandas eller komma i kontakt med hud och slemhinnor. Läkemedlet kan intas med eller utan föda.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
NU-sjukvården

Kontroller

Blodprover ska kontrolleras regelbundet och enligt särskilt schema. Är proverna bra hör du inget ifrån oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi ska kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Kontakta hudmottagningen om du misstänker eller är orolig för eventuella biverkningar. Om inte din behandlande läkare anger annat tas proverna enligt följande:

Månad 1—3: Var 14:e dag
Månad 4—6: 1 gång/månad
Månad 7—12: 1 gång varannan månad
Efter 12 månader: Var 3:e månad.

Återbesök

När man står på ett läkemedel bör man komma på regelbundna återbesök. Om du inte får kallelse till återbesök är det angeläget att du kontaktar oss så att vi kan boka in uppföljning.
Första återbesöket är individuellt och du får besked av din läkare när du startar.

Eventuella biverkningar

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda går de tillbaka om man minskar dosen eller slutar med medicinen.

Illamående, förstoppning eller diarré kan förekomma i samband med tablettintag. Andra eventuella biverkningar är feber och muskelvärk, blåsor i munnen, minskat antal vita blodkroppar som kan leda till ökad infektionskänslighet och minskat antal blodplättar (trombocyter) som kan ge ökad blödningsbenägenhet. Andra rapporterade biverkningar är krampanfall, depression, ångest.

Det föreligger ökad risk för hudtumörer vid behandling med mykofenolsyra varför försiktighet med solning rekommenderas.

Graviditet och amning

Mykofenolsyra är fosterskadande och ska inte användas under graviditet. Risken för spontan abort och för missbildning är hög. Innan uppstart av behandling kontrolleras därför graviditetstest (fertil kvinna) och lämpligt preventivmedel ska användas under behandling med mykofenolsyra och under 6 veckor efter avslutad behandling. Mykofenolsyra ska inte heller användas under amning.

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
NU-sjukvården

Begränsade kliniska data tyder inte på en ökad risk för missbildning eller missfall efter att fadern exponerats för mykofenolsyra. Läkemedelsbolag rekommenderar som försiktighetsåtgärd ändå graviditetsskydd till och med 90 dagar efter avslutad behandling för män.

Infektion

Vid behandling med mykofenolsyra finns en ökad risk för infektioner varför det är viktigt att du gör uppehåll med medicinen och *hör av dig till hudmottagningen om du får halsont eller annan infektion med feber.*

Operation

Inför planerad operation bör behandlingen sättas ut 2 veckor innan ingreppet och kan som regel återupptas 1–2 veckor efter operationen om inga komplikationer tillstött.

Vaccination

Årlig influensavaccination rekommenderas. På grund av den immundämpande effekten kan vaccinationer vara mindre effektiva. Levande försvagade vacciner ska undvikas.

Vid sjukdomskontakter – tala alltid om att du behandlas med mykofenolsyra/CellCept.

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:45 – 08:15, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.