Patientinformation

Adalimumab

Förlaga från hudmottagningen, SU/Sahlgrenska sjukhuset

Läkemedelsform
Injektionspenna, förfylld spruta. 20mg, 40 mg, 80mg. Det finns flera olika biosimilarer med olika namn, alla dessa innehåller Adalimumab.

Vad är Adalimumab?
Adalimumab är ett äggviteämne som har skräddarsytts för att blockera aktiviteten hos en kemisk budbärare i kroppen som kallas tumörnekrosfaktor (TNF). Denna budbärare finns i höga halter hos patienter som har de sjukdomar som Adalimumab används för att behandla. Genom att blockera TNF minskar inflammationen och sjukdomssymtomen. Adalimumab används bland annat vid psoriasis, psoriasisartrit, reumatoid artrit, hidradenitis suppurativa (HS) och vissa tarmsjukdomar.

När sätts behandlingen på hudmottagningen?
Huvudsakligen vid måttlig/svår psoriasis eller hidradenitis suppurativa där andra behandlingar inte har gett effekt eller inte kan ges.

Effekt

Effekten ses ofta efter 4–6 veckors behandling. Fortsatt förbättring kan förväntas under ytterligare några månader.

Dosering
Behandlingen ges i form av en spruta eller penna under huden (subkutant). Doseringen beror på indikationen. Mot psoriasis ges i starten 2 sprutor på samma gång och följande vecka ges 1 spruta. Härefter tar du en spruta varannan vecka. Mot hidradenitis suppurativa ges i starten 4 sprutor på samma gång. Efter 2 veckor ges 2 sprutor, därefter tar du 1 spruta varje vecka. Effekten bedöms efter 3 månaders behandling. Om behandlingen fungerar bra, så fortsätter du med sprutorna. Det finns mycket bra instruktionsfilmer som visar hur man ger Adalimumab. Filmerna är tillgängliga under läkemedlets namn på FASS.se eller medicininstruktioner.se.

Kontroller

Före insättning av Adalimumab sker blodprovstagning samt undersökning för att utesluta en latent (vilande) tuberkulos. Under behandlingen kommer du för blodprovstagning och läkarbesök med jämna mellanrum. För att upptäcka eventuella biverkningar är det mycket viktigt med dessa kontroller.

Möjliga biverkningar

Många får inga obehag alls av behandlingen. Den vanligaste biverkan är reaktioner på injektionsstället, men dessa brukar upphöra inom någon månad. Infektioner kan förekomma (bland annat förkylning, luftrörskatarr, blåskatarr och hudinfektioner). Om du får halsont eller någon annan infektion med feber ska du avbryta behandlingen med Adalimumab och kontakta din läkare eller sjuksköterska. Ta alltid kontakt med mottagningen om du får några symtom du inte känner igen.

Graviditet

Det fins inget som tyder på fosterskadande effekt av Adalimumab. Man ska dock avväga med sin läkare om behandlingen ska ges.

Amning

Adalimumab ges under amning efter avstämning med din läkare.

Vid operationer

Inför de flesta planerade operationer bör behandlingen med Adalimumab vara utsatt 2 veckor innan. Behandlingen kan som regel återupptas 1–2 veckor efter operationen om inga komplikationer tillstöter.

Vaccinationer

Inför insättning av Adalimumab rekommenderas vaccination mot lunginflammation (pneumokocker). Denna vaccination är gratis och ges på vårdcentralen efter remiss från din hudläkare. Under behandling med Adalimumab rekommenderas dessutom vaccination mot influensa och Covid. Alla vaccinationer med avdödat vaccin är tillåtet, levande vaccin (t.ex mot gula febern och mässlingen) ska inte ges. Hör av dig till hudmottagningen när du behöver råd inför vaccination.

Vid alla sjukvårdskontakter – tala alltid om att Du behandlas med Adalimumab!

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**
Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:45 – 08:15, 09:30 – 11:30
Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se
Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.