

Patientinformation

Ciklosporin

Förlaga från hudmottagningen, SU/Sahlgrenska sjukhuset

Vad är Ciklosporin?

Ciklosporin är ett läkemedel som kan användas för flera olika sjukdomar såsom svårt atopiskt eksem, prurigo nodularis eller svårare psoriasis där utvärtes medel och ljusbehandling inte är tillräcklig eller lämplig. Det kan också användas efter organtransplantation för att förhindra avstötning samt för att behandla reumatism. Den gemensamma faktorn är att man vill dämpa immunförsvaret.

Ciklosporin tas som en kapsel 2 gånger dagligen oberoende av mat. Den brukar ge snabb och effektiv läkning. Ofta märks förbättring redan på ett par veckor. Dosen justeras utifrån vikt och behandlingsresultat.

Behandlingslängden för atopiskt eksem och psoriasis kan variera från 2 månader till något år. När man uppnått behandlingsmålet sätts Ciklosporin ut. Behandlingsmålet kan innebära komplett läkning eller väsentlig förbättring. Eventuellt får behandlingen upprepas om besvären kommer tillbaka.

Dosering

Ciklosporin doseras utifrån din vikt.

- Kapslarna ska inte tas ur folieförpackningen förrän du ska ta medicinen.
- Kapslarna ska förvaras i rumstemperatur och skyddas mot kyla.

Interaktioner/Andra läkemedel kan påverka din Ciklosporinbehandling

Det finns en rad mediciner som är olämpliga att ta i kombination med Ciklosporin. Detta på grund av att olika läkemedel kan förstärka eller försvaga effekten av varandra. Det är därför viktigt att du uppger vilka läkemedel du tar till behandlande läkare, även vid behovsmediciner.

Vissa tillfälliga antibiotikakurer påverkar också Ciklosporin.

Ciklosporin ska inte kombineras med Johannesört eller grapefrukt. Vissa vaccinationer ska också undvikas under behandling.

Graviditet och amning

Ciklosporin kan användas under graviditet om det är absolut nödvändigt för moderns skull men erfarenheten är begränsad. Rådgör därför alltid med din läkare om du har önskan att bli gravid. Ciklosporin ska inte användas under amning.

Eventuella biverkningar och kontroller under behandlingen

Den allvarligaste biverkningen av Ciklosporin är att njurarna och blodtrycket kan påverkas. Detta normaliseras vanligtvis om dosen sänks eller medicinen sätts ut. Även levern kan påverkas.

Innan behandlingen inleds tas utgångsprover och blodtryck vid tre separata tillfällen. Under behandlingen kommer vi att följa blodprover och blodtryck regelbundet, i början tätare för att sedan glesas ut. Regelbundna återbesök planeras också in. Det finns risk att man blir mer mottaglig för infektioner med bakterier, virus och svamp då immunförsvaret dämpas. Andra biverkningar kan vara illamående, diarré, magsmärtor, trötthet, svullnad av tandköttet, ökad behåring, förhöjda blodfetter, nedsatt aptit, muskelkramper, muskelvärk, huvudvärk, darrning, minskad aptit, svullna vader och hudutslag.

Som vid all immundämpande medicinering finns en liten ökad risk för utveckling av tumörer framför allt i huden vid långtidsanvändning och hög dos. Vi rekommenderar därför att man begränsar solexponering under behandlingen.

Har du funderingar kring eventuella biverkningar du upplever får du kontakta din läkare!

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:30 – 08:00, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.

Hudmottagningen Uddevalla sjukhus NU-sjukvården
