Patientinformation

Imikvimod 5% kräm för basaliom

Du har fått Imikvimod 5% kräm för behandling av ytligt basaliom. På apoteket finns flera utbytbara preparat som innehåller Imikvimod 5%, till exempel Aldara eller Bascellex.

Vad är ytligt basaliom?

Ytligt basaliom är en långsamtväxande form av hudcancer. Den har mycket liten sannolikhet för spridning till andra delar av kroppen. Basaliom kan orsakas av för mycket solexponering. Behandlas inte basaliomet fortsätter det växa kontinuerligt genom all vävnad omkring med sårbildning som följd.

Vill du veta mer, gå in på www.hudguiden.se

Vad är Imikvimod?

Imikvimod är en substans som stimulerar kroppens eget immunförsvar i huden för att göra sig av med de skadade cellerna.

Så här gör du:

Imikvimod 5% kräm ska strykas på varje kväll innan sänggående 5 dagar i sträck under 6 veckors tid. Stryk exempelvis på krämen måndag till fredag och låt sedan bli att använda krämen under lördag och söndag.

- Tvätta händerna och behandlingsområdet med tvål och vatten. Torka noga.
- Massera försiktigt in krämen på och 1 centimeter runt det angripna området tills krämen gått in i huden.
- Tvätta händerna med tvål och vatten.
- Låt krämen vara kvar på huden i cirka 8 timmar, du får inte duscha eller bada under denna tid.
- Efter cirka 8 timmar tvättar du det behandlade området med tvål och vatten.

Huden reagerar på olika sätt

Hudreaktioner av Imikvimod beror på att den stimulerar immunförsvaret att reagera på något onormalt, till exempel ett basaliom. Dessa reaktioner är ett synligt tecken på att behandlingen fungerar. Det kan klia lite i området som

behandlas. Andra vanliga reaktioner är att huden blir röd, irriterad eller sårig. Du kan också uppleva en stickande eller brinnande känsla i huden. Det är sällsynt att behandlingen upplevs som smärtsam. Ibland kan immunreaktionen orsaka sjukdomskänsla eller feber. Symptomen är oftast milda och svarar på inflammationshämmande smärtmedel som Alvedon, Ipren eller Naproxen.

Blir reaktionen för besvärande under behandlingen bör du tala med en läkare som kan råda dig om du eventuellt bör ta en paus i behandlingen.

Behandlingsöversikt

Används på ordinerade lokaler 5 gånger i veckan i 6 veckor.

Markera i kalendern när du applicerat Imikvimodkräm för att komma ihåg att du har behandlat dig.

Jag började min behandling: _____

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag
	Imikvimod	Imikvimod	Imikvimod	Imikvimod	Imikvimod	Uppehåll	Uppehåll
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Försiktighet

- Se till att inte få Imikvimodkräm i ögonen.
- Täck inte det behandlade området med bandage eller liknande.

Använd inte sollampor eller solarium och undvik solljus under behandling med Imikvimod.

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:45 – 08:15, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.