



Patientinformation

Hidradenitis Suppurativa (HS) – Behandling med biologiskt läkemedel

Vad är ett biologiskt läkemedel?

Biologiska läkemedel är skräddarsydda för att inverka på inflammationssystemet och blockera aktiviteten hos kemiska budbärare (cytokiner) som till exempel tumörnekrosfaktor (TNF) eller interleukiner (IL). Dessa cytokiner finns i höga halter hos patienter med inflammatoriska sjukdomar som till exempel hidradenitis suppurativa (HS). Genom att blockera dessa ämnen minskar inflammationen och sjukdomssymtomen.

Biologiska läkemedel används bland annat vid HS, psoriasis, psoriasisartrit, inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatoid artrit. Användningen startades upp på 2000-talet, i början mot reumatoid artrit, senare mot psoriasis och för HS sedan 2015.

Det finns idag 3 biologiska läkemedel som är registrerade för användning mot HS (Adalimumab, Sekukinumab och Bimekizumab) För flera andra biologiska läkemedel har man kunnat visa effekt i mindre studier.

När sätts behandlingen in?

Vid måttlig till svår HS och behov av kontinuerlig behandling eller när annan systembehandling inte är tillräcklig eller genomförbar. Effekten kan märkas efter 4–8 veckors behandling, en första utvärdering sker vanligtvis efter 3 månader. Särskilt vid bra behandlingssvar kan ytterligare förbättring ske under första behandlingsåret.

Utredning inför start av biologiskt läkemedel

Före insättning av biologiskt läkemedel ska underliggande sjukdomar och infektioner (särskilt latent tuberkulos) uteslutas med blodprover och lungröntgen.

Behandlingsstart

Behandling sker med subkutana injektioner genom spruta eller injektionspenna, vissa biologiska läkemedel ges även intravenöst som infusion. Man brukar starta med en uppladdningsfas där doseringen av medicinen är högre och avstånden tätare. Efter den fasen går man över till underhållsbehandling med regelbundna doseringar från en gång i veckan till var tredje månad beroende på läkemedlet. Injektionstekniken för subkutan injektion är enkel och lätt att lära sig. För de flesta preparat finns bild- och videoinstruktioner på nätet (www.medicininstruktioner.se).

Återbesök

När man står på ett biologiskt läkemedel bör man komma på regelbundna återbesök. Kontrollerna brukar ske 3 månader efter behandlingsstart och därefter var 6:e-12:e månad för att följa upp behandlingseffekten. Om du inte får kallelse till återbesök är det angeläget att du kontaktar oss så att vi kan boka en uppföljning.

Blodprovskontroller

Första blodprovskontrollen är efter 3 månader, därefter var 6:e månad.

Möjliga biverkningar

De flesta patienter har inga obehag av sin behandling. Den vanligaste biverkan är reaktion på injektionsstället. Andra biverkningar kan vara ökad infektionskänslighet såsom förkyningar eller urinvägsinfektioner. Preparattypiska biverkningar kan du även läsa i läkemedelsinformationen eller FASS. Utvecklar du några symtom du inte känner igen, kontakta gärna hudmottagningen.

Vid sjukdom

Vid svårare infektioner med feber eller kraftig sjukdomskänsla bör du göra uppehåll med din behandling. Om du är osäker, kontakta hudmottagningen.

Vid operation

Inför planerad operation kan man behöva göra uppehåll med biologisk behandling. Det beror på typ av operation samt vilka övriga sjukdomar och behandlingar man har. Beslut fattas av opererande läkare.

Graviditet och amning

Se information gällande ditt läkemedel.

Vaccinationer

Inför behandling med biologiskt läkemedel kan vaccination mot lunginflammation (pneumokocker) vara lämpligt. Det rekommenderas även årlig influensavaccination. Levande vaccin ska inte tas under behandling med biologiska läkemedel. Kontakta gärna hudmottagningen för rådgivning. Vid sjukvårdskontakter, tala alltid om att du behandlas med biologiskt läkemedel.

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:30 – 08:00, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.