

Patientinformation

Skötsel av sår efter elektrokoagulation

Efter borttagning och bränning av hudförändringar kan måttlig svullnad förekomma de närmaste dagarna - särskilt kring ögonen efter behandling i övre delen av ansiktet. Rengör såret med tvål och vatten och täck eventuellt med förband, såret läker dock bäst utan.

Mot slutet av första veckan kan en varliknande, ibland blodfärgad vätska, komma fram under kanten av sårskorpan. Detta är ett normalt tecken på att skorpan börjar lossna (ej symtom på infektion). Intorkad sårvätska tvättas bort med tvål och vatten. Under andra och tredje veckan kan man avlägsna den lösa skorpan.

De två första veckorna kan blödning från såret inträffa. Tryck då en kompress eller liknande mot såret tills blödningen upphör.

Efter läkning kan äret vara rodnat och kännas tjockt. Detta är ej tecken på att hudförändringen är kvar. Med tiden blir äret blekt, tunt och mjukt.

Kontakt

Hudmottagningen
Uddevalla sjukhus
Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:
Måndag – Fredag: 07:30 – 08:00, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.