



Patientinformation

Till dig som ska behandlas med Dupixent

Förlaga från hudmottagning, SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Läkemedelsform

Injektionsvätska förfylld injektionspenna/spruta 200 mg och 300 mg.

Vad är Dupixent?

Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab. Det är en monoklonal antikropp som blockerar proteinerna IL4 och IL13. Båda har en viktig roll för orsaken till symtom av atopiskt eksem, astma och kronisk bihåleinflammation med näspolyper. Dupixent kan förbättra hudens tillstånd och minska klådan vid atopiskt eksem. Det har också visats lindra symtom på smärta, ångest och depression i samband med atopiskt eksem.

När sätts behandlingen in?

Behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna som har haft otillräcklig effekt av lokalbehandling, ljusbehandling eller annat systemiskt läkemedel.

Dosering

Startdosen för vuxna som väger 60 kg eller mer är två injektioner Dupixent à 300 mg och därefter en injektion à 300 mg varannan vecka. För barn och ungdomar används andra doser och intervall mellan doserna beroende på ålder och vikt. För information om medicinen och injektionsteknik se www.medicininstruktioner.se.

Kontroller

Blodprover tas innan behandlingen påbörjas, 3 månader efter start och därefter en gång per år. Blodprover omfattar blodceller, lever- och njurfunktion. Det är viktigt att du sköter dina provtagningar.

Återbesök

När man står på ett läkemedel bör man komma på regelbundna återbesök. Om du inte får kallelse till återbesök är det angeläget att du kontaktar oss så att vi kan boka in uppföljning. Första besöket efter start är 3 mån därefter var 6:e-12:e månad.

Möjliga biverkningar

Den vanligaste biverkan är reaktioner på injektionsstället som kan ge rodnad, svullnad och klåda.

Andra vanliga biverkningar:

Ögonbesvär så som torrhet, rodnad, klåda, svullnad av ögonlock samt ögoninfektioner. Ögonbiverkningar kan förebyggas med behandling. Huvudvärk. Munsår på läppar och hud.

I mycket ovanliga fall kan Dupixent orsaka överkänslighetsreaktion (andningsproblem, svullnad av ansikte, mun, svalg eller tunga, nässelutslag, feber, allmän sjukdomskänsla med mera). Om du drabbas av detta sluta omedelbart med Dupixent och kontakta din läkare.

Vid sjukdom

Vid infektioner där du får feber eller har sjukdomskänsla bör du göra uppehåll med din behandling. Är du osäker kontakta din mottagning.

Graviditet och amning

Dupixent bör inte användas om du är gravid eller planerar att bli gravid. Anledningen är att effekten av Dupixent på gravida kvinnor och foster är otillräckligt studerad. Det är inte heller känt om Dupixent utsöndras i bröstmjolk. Du bör därför avstå amning till dess att du diskuterat med din läkare.

Vaccinationer

Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas. Levande vaccin ska inte tas under behandling med Dupixent. Kontakta mottagningen som skriver ut Dupixent om du har frågor om annan vaccination.

Vid operationer

Inför planerad operation kan uppehåll i behandling behöva göras. Typ av operation, övriga sjukdomar och behandlingar kan påverka beslutet som fattas av den opererande läkaren. Vid uppehåll kan behandlingen återupptas när operationssåret är läkt.

Vid sjukvårdskontakter – tala alltid om att du behandlas med Dupixent.**Kontakt**

Hudmottagningen

Uddevalla sjukhus

Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:

Måndag – Fredag: 07:45 – 08:15, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.