



Patientinformation

Hydroxiklorokin (Plaquenil), Klorokinfosfat

Förlaga från hudmottagningen, SU/Sahlgrenska sjukhuset

Hydroxiklorokin/Klorokinfosfat är antimalaria-medel som också används vid behandling av vissa led- och hudsjukdomar. När det gäller hud så används läkemedlen till bland annat lupus erythematosus (LE), polymorf ljusdermatos och porfyriacutanea tarda (PCT). Båda medicinerna är nära besläktade och med likartad biverkningsprofil/uppföljning varför de delar informationsblad.

Dosering

Om din diagnos är diskoid LE eller subakut kutan LE börjas normalt behandling med Hydroxiklorokin (Plaquenil) 400 milligram dagligen. Effekten är långsamt insättande men efter någon/några månader ser man ofta resultat och dosen kan sänkas till 200 milligram dagligen. Totala längden på behandlingen varierar och får diskuteras med din läkare. Vid polymorf ljusdermatos ges 400 milligram dagligen under perioden med maximal ljusexponering.

Porfyria cutanea tarda kan behandlas genom regelbundna blodtappningar men också med Klorokinfosfat. Dosen är vanligtvis 0,5 tablett, 2 gånger i veckan. Tablett och blodtappningar kombineras ibland för att ytterligare förbättra effekt och blodvärden.

Kontroller

Blodprover lämnas före behandlingsstart, efter en månad och därefter var tredje månad. Man kontrollerar då bland annat blodkroppar och njurvärde. Inga ögonkontroller behövs på rutin men kan bli aktuellt om det uppstår synpåverkan (sällsynt).

Biverkningar

Övergående illamående och aptitlöshet, oftast i början av behandlingen. Yrsel och sömnstörningar kan förekomma. Ackomoderationsstörningar, det vill säga svårighet att fixera blicken, förekommer ibland men är ofarligt och oftast övergående.

Känsligheten för sol ökar och enskilda personer kan få solexem. Man kan då göra uppehåll under 2–3 månader under sommartid. Hörselnedsättning och muskelsvaghet kan förekomma, men är mycket ovanligt. Ögats näthinna kan i sällsynta fall påverkas vid långtidsbehandling.

Tänk på:

Hydroxiklorokin (Plaquenil) är giftigt för barns hjärtan (kardiotoxiskt) varför läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn.

Samtidig rökning vid behandling med Hydroxiklorokin (Plaquenil) försämrar kraftigt behandlingseffekten!

Kontakt

Hudmottagningen

Uddevalla sjukhus

Telefon: **010-435 52 60**

Telefontider:

Måndag – Fredag: 07:30 – 08:00, 09:30 – 11:30

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.