



Patientinformation

## Carvedilol

### **Patientinformation vid behandling med Carvedilol för att förebygga blödning från esofagusvaricer (åderbräck i matstrupen).**

Blodet från matsmältningsorganen passerar genom levern innan det når hjärtat. Levern har en viktig uppgift att bearbeta de näringsämnen som absorberats från magtarmkanalen. Vid kronisk leversjukdom med förekomst av stora mängder ärrvävnad i levern får blodet svårare att passera levern. Trycket i bukens vener ökar.

En del av blodet finner nya vägar förbi levern. Den viktigaste av dessa nya vägar är venerna i nedre delen av matstrupen. Normalt är det minimalt med blod som passerar venerna i matstrupen men när trycket stiger i bukens vener utvidgas dessa vener och det bildas åderbräck (varicer).

Åderbräcken i sig ger inga symptom men det finns risk för att blödning uppstår. Oftast märks det i form av illamående följt av blodiga kräkningar eller mörk avföring. Man ska då söka sjukvård akut.

Förebyggande behandling kan ges för att sänka blodtrycket i bukens vener och därmed minska risken för blödning.

Läkemedlet är av typen betablockerare och namnet på läkemedlet är Carvedilol:

- Detta läkemedel kommer att minska hjärtats frekvens (puls) samt även sänka blodtrycket.

- Det är viktigt att starta behandlingen försiktigt i låg dos. Varje vecka bokas tid för blodtrycks- och pulskontroll. Samtidigt får du information om dosen av Carvedilol kan ökas.
- Biverkningar som kan förekomma är yrsel till följd av blodtrycksfall.
- Målet med behandlingen är att sänka pulsen i vila till cirka 60 slag/min.

**Kontakta oss vid misstänkt biverkan, om recept behöver förnyas eller om kontakt med oss önskas innan nästa bokade besök.**

Du kan kontakta oss via 1177, Mina Vårdkontakter.

Telefontid:            måndag-torsdag klockan 9:00-11:00  
                             fredag                    klockan 9:00-10:30.

Telefonnummer:    010 - 435 48 10