

Patientinformation

Förberedelser inför gastroskopi

Gastroskopi är en endoskopisk undersökning av och matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Var god och läs igenom all information innan så att du kommer förberedd till mottagningen.

- **Du ska vara fastande (inte äta eller dricka), de närmaste sex timmarna innan undersökningen.** Det är viktigt att det inte finns mat och vätska kvar i magsäcken vid undersökningen.

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel:

-Du som behandlas med **Waran** ska ta ett **PK-prov på undersökningdagen**. Ring laboratoriemedicin i god tid och boka din provtagning (tel.nr. på nästa sida). Om du fått en provtagningslapp med i detta brev ska den tas med till laboratoriet.

-Du som behandlas med något av nedanstående läkemedel ska **inte** ta läkemedlet på undersökningens morgon.

<i>Substansnamn:</i>	<i>Till exempel:</i>
Dabigatranetexilat	Pradaxa
Rivaroxaban	Rivaroxaban, Xarelto
Apixaban	Eliquis
Edoxaban	Lixiana

- Om du har andra mediciner, till exempel blodtrycksmediciner, kan du ta dem som vanligt med **lite** vatten, dock inte senare än två timmar innan undersökningen.
- Om du är **insulin- eller tablettbehandlad diabetiker** ska du kontakta ditt diabetesteam på vårdcentralen i god tid innan undersökningen för att rådfråga om eventuella dosändringar i medicineringsplanen.
- Om du har **pacemaker eller implanterad defibrillator (ICD)** ska du ringa till oss på endoskopimottagningen och meddela detta (tel.nr. på nästa sida).

Hur går undersökningen till?

Innan undersökningen får du **spraybedövning** i svalget. Efter sprayen får du inte äta och dricka på en timme på grund av att det finns risk att du sväljer fel när bedövningen sitter i. Ofta räcker det med svalgbedövning. Det finns även möjlighet att få **lugnande och smärtstillande** mediciner. Vi sätter då en infart i ett blodkärl i armen innan undersökningen.

- **Observera** att du inte får köra bil efteråt och resten av dagen om vi gett dig lugnande och smärtstillande mediciner.

Du ligger på din vänstra sida vid undersökningen. En kameraförsedd mjuk slang förs via munnen genom matstrupen, ner i magsäcken och ut i övre delen av tolvfingertarmen. Bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att slemhinnan kan inspekteras noggrant.

Om det behövs kan skopisten ta små vävnadsprover av slemhinnan för mikroskopisk undersökning. Det kan också bli aktuellt att utföra mindre kirurgiska ingrepp via slangen, exempelvis borttagande av polyper.

Själva undersökningen tar cirka 5-10 minuter. Hela besöket tar cirka 30 minuter.

Kontakt:

Endoskopimottagningen, NU-sjukvården

Telefon: 010-435 35 80
Telefontider: måndag-torsdag: 08:00-11:00
fredag: 08:00-10:00
eller via www.1177.se

Laboratoriemedicin, NU-sjukvården

Telefon: 010 - 435 27 01
Telefontider: måndag-onsdag 10:30-14:30
torsdag-fredag 10:30-14:00
lunchstängt 12:00-13:00

