



Patientinformation

Abrasio

Operation av körtel bakom näsan

Varför har man en körtel bakom näsan?

Körteln bakom näsan, liksom halsmandlarna, utgör en del av försvaret mot infektioner. Den finns hos alla barn men tillbakabildas i puberteten. Hos vuxna saknas den oftast.

Varför tar man bort körteln bakom näsan?

Man opererar bort körteln bakom näsan om den bedöms försvåra andningen genom näsan. Besvären kan yttra sig genom att barnet ständigt andas genom öppen mun och har störande snarkning. Barnet kan även ha orolig nattsömn med ibland förekommande andnings-uppehåll och tidvis dag- och kvällströtthet. Långdragen öronkatarr kan också vara en anledning att utföra denna operation. Hos vissa barn kan svårigheter att tala rent vara orsakade av körteln bakom näsan.

Är det någonting jag skall tänka på innan barnet kommer till sjukhuset?

Om Ditt barn verkar vara infekterat, förkyllt eller har feber dagen före operationen bör Du kontakta operationsplaneraren för diskussion om operationen skall genomföras. Kontrollera temperaturen operationsdagens morgon.

Hur mår man efter operationen?

Någon dag efteråt kan barnet ha ont i halsen. Barnet kan få en lätt höjning av temperaturen och en lätt blödning efter operationen, vilket är helt normalt. Om blödning, smärta och/eller feber tillstöter kontakta Öron-, näs- och halsmottagningen dagtid eller Sjukvårdsupplysningen under övrig tid, tel 1177.

Finns det några förhållningsregler efter operationen?

Operationsdagen ges flytande kall kost, därefter får barnet pröva sig fram. Barnet bör vara hemma 4 dagar.

Barnet kan gå ut i sällskap med förälder dagen efter operationen.

Barnet bör ej idrotta under 7-10 dagar efter operationen. Undvik att Ditt barn kommer i kontakt med infekterade personer.

Har Du några frågor inför operationen?

Kontakta operationsplanerare för Öron-, näs- och halskliniken:

☎ 010 – 435 37 28 måndag - torsdag kl 08.00 – 10.00.

Kontakta oss

ÖNH-mottagningen

NÄL

461 85 Trollhättan

☎ 010 – 435 37 00

www.nusjukvarden.se