



## Patientinformation

# Ossikuloplastik – rekonstruktion av hörselbenskedjan

## Vilken är hörselbenens funktion?

Det finns tre hörselben: hammaren, städet och stigbygel. Dessa är förbundna med varandra och har till uppgift att överföra trumhinnans rörelse och därmed ljudet till innerörat via det ovala fönstret.

## Hur uppstår skador på hörselbenskedjan och vilka symptom ger detta?

Infektioner kan vara orsak till att enskilda hörselben skadas och att förbindelsen mellan benen avbryts. Kraftiga slag mot huvudet kan medföra att hörselbenen hoppar ur led eller fraktureras. Det vanligaste och i regel enda symtomet är hörselnedsättning av så kallad ledningshindertyp, det vill säga innerörats funktion är helt normal. Ibland besväras man även av sus i örat. På grund av att innerörat är intakt är hörapparat ett alldeles utmärkt och ofarligt hjälpmedel. Många patienter är ofta helt nöjda med denna behandling.

## Hur utförs operationen?

Patienten kan vara sövd men operationen kan ibland göras i lokal-bedövning. Operatören lägger ett snitt i huden i hörselgången eller bakom örat. Operationen syftar till att förbättra hörseln genom att återskapa en rörlig förbindelse mellan trumhinnan och det ovala fönstret. Då kan man antingen använda det skadade hörselbenet eller en protes av annat material t.ex. titan. Operationen tar cirka två timmar.

## Efter operationen?

Det första dygnet efter operationen kommer du att ha ett stort bandage omkring huvudet. Detta avlägsnas dagen efter operationen. I samband med operationen läggs remsor indränkta i salva i hörselgången och man får stygn framför eller bakom örat beroende på snittet. Dessa tas bort vid återbesöket efter en dryg vecka. En del vätska rinner från örat första dygnet.

Det är normalt att uppleva en viss värk i örat några dagar efter ingreppet. Detta kan lindras med vanliga smärtstillande tabletter. Om blödning, kraftig värk eller feber tillstöter kontakta Öron-, näs- och halsmottagningen dagtid eller Sjukvårdsupplysningen under övrig tid, tel 1177.

Det lilla benet/protesen läggs på plats och stöttas men sys inte fast. Detta betyder att det finns en viss risk att det nya benet kan flytta sig i fel läge den första tiden efter operationen. Därför är det viktigt att inte lyfta tungt eller anstränga sig kraftigt närmaste veckorna efter operationen och man ska undvika att snyta sig närmaste tiden. Beroende på vad man har för arbete kan man behöva vara sjukskriven 1-3 veckor. Under 1,5 månader efter operationen ska du avstå från att flyga. Det är viktigt att inte få in vatten i örat innan såret i örat har läkt. Skydda hörselgången med fetvadd till återbesöket efter två månader. Förändrad smakupplevelse på tungans främre del kan förekomma första veckorna. Nedsatt känsel på ytterörat är normalt under några månader. Hörseln är nedsatt närmaste tiden efter operationen och man har en lockkänsla i örat på grund av sårvätska och svullnad. Efter cirka två månader och sedan efter ett år kommer du att kallas på kontroll med hörseltest.

## Lyckas operationen alltid?

Nej. Resultaten är ofta goda men är beroende av hörselbensskadans läge och omfattning.

## Komplikationer

Vid varje öronoperation finns en risk för att hörseln kan skadas. Risken för grav hörselskada är mindre än 1 %. Infektion inträffar hos cirka 4 %. Övergående yrsel och tinnitus kan förekomma. Bestående tinnitus förekommer hos cirka 1 %. Bestående smakförändring förekommer hos cirka 0,5 %. Ansiktsnerven ligger också i operationsområdet men ansiktsförflamning är extremt sällsynt.

## Har du några frågor inför operationen?

Kontakta operationsplanerare för Öron-, näs-, hals- och käk-kirurgiska kliniken:

☎ 010 – 435 37 28 måndag - torsdag kl 08.00 – 10.00.

## Kontakta oss

ÖNH-mottagningen  
Norra Älvsborgs Lasarett  
461 85 Trollhättan  
☎ 010 – 435 37 00