Patientinformation

Submandibularisexstirpation – operation av underkäksspottkörteln

Varför tar man bort underkäksspottkörteln?

Några anledningar till operation av underkäksspottkörteln är stenbildning, återkommande akuta inflammationer, kroniska infektioner och godartade knutor.

Hur utförs operationen?

Operationen sker i narkos. Hudsnitt läggs på halsen parallellt med underkäken och blir 6 - 8 cm långt. I nära anslutning till körteln passerar olika nerver och kärl som går till hakan och mungipan samt tungan. Hela körteln avlägsnas och dränagerör inlägges.

Hur mår man efter operationen?

Smärta kan förekomma men är ovanligt. Dränagerör avlägsnas efter cirka 1 – 2 dygn. Stygnen i huden tas efter cirka 7 – 10 dagar och sedan tejpas såret ytterligare 1 vecka. Om blödning, smärta och/eller feber tillstöter kontakta Öron-, näs- och halsmottagningen dagtid eller Sjukvårdsupplysningen under övrigt tid, tel 1177.
Första veckorna efter operationen ses ibland en övergående svaghet i mungipan. I enstaka fall kan nervskadan bli bestående. Känselnedsättning kring operationsområdet är inte helt ovanligt men normaliseras efter ett halvt till ett år.

Hur länge ska jag vara sjukskriven eller hemma från skolan?

Du kommer att vara sjukskriven 1 – 2 veckor beroende på vilket arbete du har.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
NU-SJUKVÅRDEN

Har du några frågor inför operationen?

Kontakta operationsplanerare för Öron-, näs-, hals- och käk-kirurgiska kliniken:
☎ 010 – 435 37 28 måndag - torsdag kl 08.00 – 10.00.

Kontakta oss

ÖNH-mottagningen
Norra Älvsborgs Lasarett
461 85 Trollhättan
☎ 010 – 435 37 00

www.nusjukvarden.se