



Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som polikliniskt skall operera bort peritonealdialyskatater (PD-kateter)

Läs igenom: "Information inför din operation"

- Du skall själv förbereda dig inför ingreppet enligt bifogad patientinformation "**Helkroppsvätt inför ingrepp genom huden**".
- Urinblåsan skall vara tömd innan ingreppet.
- Ingreppet sker i lokalbedövning vilket innebär att du kommer känna beröring men inte smärta.
- Du bör inte vara ensam hemma operationsdygnet.
- Du skall inte anstränga dig eller lyfta något, utan vila resten av dagen.
- Om du har ont efter du kommit hem kan du ta:
T Alvedon 500 mg 1-2 tabletter, max 4 gånger/dag.
T Oxynorm 5mg 1 tablett, max 2 gånger/dag.
- Du skall vara uppmärksam på infektionstecken (så som rodnad, feber, ökad svullnad och smärta) och blödning. Kontakta dialys-, njursviktsmott eller avdelning 42.

Kontaktuppgifter

Dialysmottagningen: 010-435 53 30
Njursviktsmottagningen: 010-435 53 33
Njurmedicinsk vårdavdelning 42: 010-435 04 20