

Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som skall genomgå poliklinisk PD-kateter operation

Du skall få en PD-kateter (tunn siliconslang) för att peritonealdialysbehandling ska kunna genomföras. På katetern sitter det två kuffar (filtkuddar) som växer fast under huden. Denna förhindrar att katetern åker ut samt läckage av PD-vätska. Den minskar också risken för att bakterier tar sig in i bukhålan. Katetern skall helst läka fast 14-21 dagar innan den används för dialysbehandling.

- Läs igenom: **“Information inför din operation”**
- Du skall själv förbereda dig inför ingreppet enligt bifogad patientinformation **“Helkroppstvätt inför ingrepp genom huden”**.
- Eventuellt uppehåll med blodförtunnande mediciner.
- Du skall ta Laktulos 15 ml/dag i 7 dagar före operationen (receptfritt på apoteket).
- På operationsdagens morgon skall du laxera med Resulax (fås på mottagningen).
- Operationen sker i lokalbedövning vilket innebär att du kommer att känna beröring men inte smärta. I vissa fall kan man behöva sövas.
- Du bör inte vara ensam hemma operationsdygnet.
- Du skall inte anstränga dig eller lyfta något, utan vila resten av operationsdagen.
- Personal från PD-mottagningen besöker dig på uppvaket efter operationen för att kontrollera förbandet och lämna återbesökstid.

Kontaktuppgifter

PD-mottagningen: 010-435 53 39
Njursviktsmottagningen: 010-435 53 33
Njurmedicinsk vårdavdelning 42: 010-435 04 20