



Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som skall genomgå poliklinisk PD-kateter operation

Du skall få en PD-kateter (tunn siliconslang) för att peritonealdialysbehandling ska kunna genomföras.
Katetern skall helst läka fast 14-21 dagar innan den används för dialysbehandling.

- Läs igenom patientinformation: **“Information inför din operation”**
- Du ska duscha med bakteriedödande tvål se patientinformation.
- Eventuellt uppehåll med blodförtunnande mediciner.
- Du skall ta Laktulos 15 ml/dag i 7 dagar före operationen (receptfritt på apoteket).
- På operationsdagens morgon skall du laxera med Resulax (fås på mottagningen).
- Operationen sker i lokalbedövning vilket innebär att du kommer att känna beröring men inte smärta. I vissa fall kan man behöva sövas.
- Du bör inte vara ensam hemma operationsdygnet.
- Du skall inte anstränga dig eller lyfta något, utan vila resten av operationsdagen.
- Personal från PD-mottagningen besöker dig på uppvaket efter operationen för att kontrollera förbandet och lämna återbesökstid.

Kontaktuppgifter

PD-mottagningen: 010-435 53 39
Njursviktsmottagningen: 010-435 53 33
Njurmedicinsk vårdavdelning 42: 010-435 04 20