



Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till dig som ska få en peritonealdialyskateter (PD kateter)

Du skall få en PD-kateter (tunn siliconslang) i buken för att peritonealdialysbehandling skall kunna genomföras. För att förhindra infektion kommer det alltid behöva sitta ett förband över katetern. Helst ska katetern läka fast 14-21 dagar innan den används för dialysbehandling.

- Du kommer själv förbereda dig för ingreppet enligt bifogad patientinformation om "Helkroppstvätt inför ingrepp genom huden".
- Eventuellt uppehåll med blodförtunnande mediciner om du äter detta.
- Dagen före operationen blir du inlagd på avdelning 42 och stannar oftast kvar över natten.
- Du är fastande från klockan 24:00 natten till operationsdagen, vilket innebär att du varken får äta eller dricka.
- Du behöver ta Laktulos 15ml/dag i 7 dagar före operationen för att hålla magen igång och underlätta för dig att gå på toaletten efteråt då du kan vara öm i magen. Laktulos kan köpas receptfritt på ditt apotek.
- På operationsdagens morgon får du laxermedel för att tömma tarmen, urinblåsan skall också tömmas.
- Operationen sker i lokalbedövning, vilket innebär att du kommer att känna beröring men inte smärta. I vissa fall kan sövning behövas.
- Det är viktigt att inte anstränga magen efter operationen utan vila resten av dagen. Du kan eventuellt uppleva smärta i magen efter ingreppet och kommer då kunna få smärtlindring.
- Lämna smycken och värdesaker hemma.

Hör gärna av dig om du har funderingar.

Kontaktuppgifter

PD-mottagningen: 010-435 53 39 (telefonid vardagar 09:30-11:00)

Njursviktsmottagningen: 010-435 53 33 (telefonid vardagar 9:45-10:45)

Njurmedicinsk avdelning 42: 010-435 04 20