



Patientinformation
Dialys- och Njursviktsmottagningen NU-sjukvården

Till Dig som fått en peritonealdialyskateter (PD-kateter)

Du har fått en kateter som löper i en tunnel under huden och in i bukhålan. På katetern sitter det två kuffar (filtkudde) som växer fast under huden. Denna förhindrar att katetern åker ut samt förhindrar läckage av PD-vätska. Den minskar också risken för att bakterier tar sig in i bukhålan.

- Före hemgång inspekteras förbandet av personalen och byts om det behövs. Förbandet bör sedan ej avlägnas innan återbesöket på PD-mottagningen.
- Det är bra om du själv observerar förbandet hemma. Material för att förstärka förbandet samt instruktioner om hur du gör får du av PD-mottagningens personal.
- Undvik att duscha innan första återbesöket.
- Det är mycket viktigt att katetern är väl fixerad och inte utsätts för ryck.
- Stygnen på magen tas bort på PD-mottagningen efter 10-14 dagar.
- De första veckorna ska du inte utföra fysiskt hårt arbete eller lyfta mer än cirka fem kilo. Detta för att låta bukmuskulerna läka efter operationen. Att promenera är ofarligt.
- Tänk på att hålla magen igång då förstoppning kan medföra att katetern fungerar sämre.
- Vid blödning, läckage, feber eller ökad smärta i buken kontakta PD-mottagningen eller avdelning 42.

Kontaktuppgifter

PD-mottagningen: 010-435 53 39 (telefon tid vardagar 09:30-11:00 övrig tid telefonsvarare)
Njurmedicinsk avdelning 42: 010-435 04 20