



Patientinformation

Dialys- och njursviktsmottagning NU-sjukvården

Njurfunktionsundersökning

Förberedelse

Du får inte ha genomgått undersökning med jodhaltig kontrast (till exempel vissa datortomografiundersökningar, röntgenundersökningar eller scintigrafi) de senaste tre dygnet före njurfunktionsundersökningen. Det får inte ske så länge undersökningen pågår.

- Du får inte vara kontrast- eller jodöverkänslig (fisk- och skaldjurallergi räknas inte som jodöverkänslighet).
- Du behöver inte vara fastande.
- Om du väger under 40 kg vänligen kontakta oss då njurfunktionsundersökningen får göras på annan enhet.

Utförande

Besöket här tar 30-45 minuter. Vi kommer att väga och mäta dig. Därefter kommer vi att sätta en kanyl i ett blodkärl och injicera ett jodhaltigt kontrastmedel. Efterföljande prover, för att mäta koncentrationen av kontrastmedlet i blodet, kommer att ske med ett visst tidsintervall efter injektionen. Detta för att kunna räkna ut din njurfunktion.

Du kommer att lämna prover på din vårdcentral

Vänligen kontakta din vårdcentral för efterprovtagning enligt nedan.

- 3 timmar efter injektionen.
- 5 timmar efter injektionen.
- 24 timmar efter injektionen.