



Patientinformation

Operation av grå starr vid närsynthet

Vid operationen byts ögats lins mot en plastlins. Dessa finns i olika styrkor och det finns möjlighet att välja en lins som minskar närsyntheten ordentligt. Oftast är detta enbart möjligt om det är behov av att operera båda ögonen.

Vad innebär det att inte längre vara närsynt?

Med nya utprovade glasögon blir synen bra både på långt och nära håll som tidigare.

Utan glasögon blir synen bäst på långt håll och sämre på nära håll, det vill säga tvärtom mot hur det varit förut.

Fördelar:

- Minskat glasögonberoende (kan eventuellt innebära att kunna bada i badhuset eller ta en promenad i regn utan glasögon)
- Vissa klarar sig med enbart läsglasögon

Nackdelar:

- Den som tidigare är van att läsa utan glasögon kan inte räkna med det längre utan måste vara beredd att använda glasögon vid läsning
- Vissa upplever det besvärligare att sminka eller raka sig om de sett väldigt skarpt utan glasögon på det avståndet tidigare
- Den som varit van vid att ta av sig glasögonen för att få en förstörande effekt på nära håll får ta fram ett förstöringsglas i stället
- Det kan ta tid för hjärnan att vänja sig vid den nya situationen


Tänk igenom vad som är viktigast för dig i ditt liv och berätta detta för oss innan operationen!

För den som är van vid att ligga i sängen och läsa utan glasögon och vill fortsätta att göra det är det lämpligast att fortsätta vara närsynt.

Har du tidigare använt ett öga för långt håll och ett för nära håll (monovision), berätta det för oss innan operationen.

Kontakta oss

Ögonkliniken
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

 010-435 31 00 (sjuksköterska)

www.nusjukvarden.se

Du kan också kontakta oss via Vårdguidens E-tjänster www.1177.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt via telefon 1177.