



Patientinformation

Reumatologimottagningen NU sjukvården

## KOLKICIN / COLREFUZ

Kolkicin är ett antiinflammatoriskt läkemedel som under lång tid använts som behandling mot familjär medelhavsfeber och gikt. Den exakta verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men erfarenheten av användning inom dessa områden är stor.

### **DOSERING**

Tablett Kolkicin finns i 1000, 500 eller 250 mikrogram och tablett Colrefuz finns i 500 mikrogram. Dosen kan behöva sänkas vid behandling av äldre, personer med nedsatt njur- eller leverfunktion samt vid annan samtidig behandling. Använd aldrig högre dos än den som är ordinerad. Tabletterna skall sväljas hela med vatten.

### **BIVERKNINGAR**

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda går de tillbaka om man minskar dosen eller slutar med medicinen. Vid provtagning kan man även se leverpåverkan med förhöjda levervärden och minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar men allvarliga biverkningar är ovanliga.

### **KONTROLLER**

Under behandlingen ska du lämna blodprover var 6:e månad. Det är viktigt att du följer det provtagningsschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall justera dosen, pausa eller avbryta behandlingen.

Provsvaren skickas till Reumatologmottagningen, där de granskas. Om du inte får något meddelande från oss är dina blodprovsvärden bra och du fortsätter att ta ditt läkemedel och lämnar prover.

När dina provtagningsremisser tar slut beställer Du nya genom att **Logga in på 1177.se** under **REUMATOLOGIMOTTAGNING UDDEVALLA** för att använda e-tjänster eller ring mottagningen så skickar vi nya. Du som patient ansvarar för att provtagningsordinationen följs. Recept förnyas inte om aktuella provsvar saknas.

### **GRAVIDITET OCH AMNING**

Behandlingen kan fortsätta under graviditet och amning vid medelhavsfeber. I övrigt rådfråga din läkare. Inga hinder för amning. Små mängder passerar över till barnet men risken för barnet osannolik med terapeutiska doser. Även män kan fortsätta behandlingen vid planerad graviditet.

### **OPERATION**

Man behöver inte göra uppehåll med Kolkicin inför en planerad operation men rådgör med opererande läkare.

### **VACCINATION**

Vaccination under behandling är inget hinder men levande försvagade vaccin bör undvikas till exempel; Mässling – Påssjuka – Röda hund (MPR), BCG vaccin mot tuberkulos, gula febern och bältros.

### **ALKOHOL**

Det finns risk för leverpåverkan vid alkoholintag. Mängden alkohol avgör påverkan på levern.

### **ÖVRIGT**

Kolkicin kan interagera med andra läkemedel, meddela alltid din läkare att du tar Kolkicin innan du börjar med ett nytt läkemedel. **Grapefrukt** (även juice) bör inte intas vid behandling med Kolkicin.

Informera om att du behandlas med Kolkicin vid sjuk- och tandvårdskontakter.

Är ljuskänsligt och skall förvaras i originalförpackning i rumstemperatur högst 25°C, oåtkomligt för barn.