



Patientinformation

Reumatologimottagningen NU-sjukvården

MYKOFENOLATMOFETIL

(CellCept, Myfenax, Mykofenax)

Mykofenolatmofetil (förkortat MFF) är ett läkemedel som används inom transplantationsmedicin för att förhindra avstötning av transplanterade organ men används även vid vissa reumatiska sjukdomar såsom SLE, myosit och vaskulit.

EFFEKT

Läkemedlet har en immundämpande effekt genom att förhindra celledelning av en viss typ av vita blodkroppar, s.k. lymfocyter.

DOSERING

Mykofenolatmofetil finns som tablett 500 mg eller kapsel 250 mg. Behandlingen startas i regel med 500 mg / dygn den första veckan och därefter sker en ökning med 500 mg / vecka till önskad måldos, 1500 - 3000 mg/dygn. Kapslarna skall inte öppnas och tablettorna skall inte krossas då beredningen inte får inandas eller komma i kontakt med hud och slemhinnor. MMF kan intas med eller utan föda.

BIVERKNINGAR

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda, går de tillbaka om man minskar dosen eller avslutar behandlingen. Förekommande biverkningar kan vara illamående, förstoppning eller diarré, feber och muskelvärk, ökad infektionskänslighet, blåsor i munnen, krampanfall, depression och ångest. Vid provtagning kan man upptäcka minskat antal vita blodkroppar och blodplättar.

Vid kombinationsterapi med immunosupprimerande läkemedel föreligger en ökad risk för hudmalignitet vid behandling med MMF varför försiktighet med solning rekommenderas.

KONTROLLER

Under behandlingen ska du lämna blodprover 1 gång i månaden 3 gånger vid start sen efter 3 månader och därefter utglesning till 2 gånger per år enligt ordination. Är proverna bra hör du inget ifrån oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall justera dosen, pausa eller avbryta behandlingen.

När dina provtagningsremisser tar slut beställer Du nya genom att **Logga in på 1177.se** under **REUMATOLOGIMOTTAGNING UDDEVALLA** för att använda e-tjänster eller ring mottagningen så skickar vi nya. Recept förnyas inte om aktuella provsvar saknas.

GRAVIDITET OCH AMNING

MFF skall inte användas under graviditet och kvinnor skall använda lämpligt preventivmedel under behandling med MFF och under minst 6 veckor efter avslutad behandling innan planerad graviditet. MFF skall inte användas under amning.

Även män skall använda lämpligt preventivmedel under behandling och i minst 3 månader efter avslutad behandling innan planerad graviditet.

BEHANDLINGSUPPEHÅLL

Läkemedlet kan ge ökad risk för infektioner. Om du har en infektion och/eller feber är det lämpligt att du gör uppehåll fram tills du är frisk. Kontakta din vårdcentral i första hand om du misstänker att du behöver behandling för din infektion.

OPERATION

Inför planerad operation behöver man vanligtvis inte göra uppehåll med behandlingen men rådgör med opererande läkare.

VACCINATION

Vaccination under behandling är inget hinder men levande försvagade vaccin bör undvikas till exempel Mässling- Påssjuka – Röda hund (MPR), BCG vaccin mot tuberkulos, bältros och gula febern.

ÖVRIGT

Informera alltid om att du behandlas med Mykofenolatmofetil vid alla sjuk- och tandvårdskontakter.

Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur upp till 30C°, oåtkomligt för barn.