



Patientinformation  
Reumatologimottagningen NU-sjukvården

## PLAQUENIL (Hydroxyklorokin)

Plaquenil är ett antimalariamedel som i många år använts vid behandling av ledgångsreumatism (Reumatoid artrit), SLE (Systemisk lupus erythematosus) samt vid vissa andra bindvävssjukdomar.

### **EFFEKT**

Vid behandling av RA noteras långsam minskning av sjukdomens inflammatoriska aktivitet vilket innebär att symtom som värk, stelhet och ledsvullnad minskar. Förbättringen kommer efter ca 6-8 veckor. Ibland kan Plaquenil kombineras med andra långverkande antireumatiska mediciner såsom Methotrexate och Salazopyrin. Om man har god effekt kan man fortsätta behandlingen i många år.

Antimalariamedel har en positiv effekt på hud- och ledengagemang vid SLE och rekommenderas till alla patienter med SLE på grund av flera långsiktiga positiva effekter såsom minskad skovfrekvens/sjukdomsaktivitet, minskad organskada och förbättrad överlevnad.

### **DOSERING**

Själva behandlingen består av tabletter, Plaquenil 200mg. Dosen anpassas efter kroppsvikt, diagnos och inflammatorisk aktivitet.

### **BIVERKNINGAR**

I början av behandlingen kan biverkningar så som illamående, aptitlöshet och huvudvärk förekomma men dessa är vanligtvis övergående. Likaså yrsel och sömnstörningar. Ackommodationsstörningar, det vill säga svårighet att fixera blicken, förekommer ibland men är ofarligt och oftast övergående. Känsligheten för sol ökar och enstaka personer kan få solexem. Läkare kan då ordinera behandlingsuppehåll under 2 - 3 månader under sommartid.

Hörselnedsättning och muskelsvaghet kan förekomma, men är mycket ovanligt. Ögats näthinna kan i sällsynta fall påverkas vid långtidsbehandling (>5 års behandling) varför vi har riktlinjer för ögonkontroller.

### **KONTROLLER**

Vid behandling med Plaquenil rekommenderas ögonkontroll för att upptäcka synpåverkan som kan orsakas av läkemedlet och remiss skrivs via reumatologimottagningen.

### **GRAVIDITET OCH AMNING**

Vid graviditet bör kvinnor med SLE fortsätta behandling med Plaquenil då risken för försämring i grundsjukdomen annars ökar och med behandling ökar även prognosen för en lyckad graviditet. Dock ska man sträva efter lägsta möjliga dos <400mg/dag. Rådgör alltid med din reumatolog.

Inga hinder för amning.

### **OPERATION**

Om du ska opereras behöver du inte göra uppehåll med Plaquenil men rådgör alltid med din opererande läkare.

### **VACCINATION**

Behandling med Plaquenil hindrar inte vaccinering men levande försvagade vacciner bör undvikas till exempel MPR (Mässling- Påssjuka- Röda hund) BCG vacciner mot tuberkulos, bältros och gula febern. Vid SLE och andra reumatiska systemsjukdomar bör behovet av vaccination alltid bedömas av läkare.

### **BEHANDLINGSUPPEHÅLL**

Inget behov av uppehåll med behandlingen vid infektioner.

### **ÖVRIGT**

Informera om att du behandlas med Plaquenil vid sjuk- och tandvårdskontakter.

Förvaras i rumstemperatur, oåtkomligt för barn