



Patientinformation
Reumatologimottagningen NU-sjukvården

AZATIOPRIN

Azatioprin är ett läkemedel med en hämmande inverkan på kroppens immunförsvar och har använts under många år inom transplantationsmedicin för att förhindra avstötning av transplanterade organ. På grund av dess immundämpande egenskaper används medicinen också vid inflammatoriska bindvävssjukdomar, så som SLE men även vid svår ledgångsreumatism (Reumatoid artrit), myositer (muskelinflammation) och vaskuliter (inflammation i olika blodkärl).

EFFEKT

Medicinen bromsar sjukdomens inflammatoriska aktivitet, vilket innebär att symtom som stelhet, värk, ledsvullnad och trötthet minskar. Förbättringen kommer i regel efter 2 - 4 månader. Om man har god effekt av medicinen kan man fortsätta behandlingen under många år. Numera används Azatioprin också ofta i kombination med andra långtidsverkande antireumatiska mediciner.

DOSERING

Tabletter innehållande Azatioprin 25 mg och 50 mg (tablett Azatioprin eller tablett Imurel). Doserar efter kroppsvikt vilket brukar bli 100 mg – 200 mg per dygn. Tabletterna bör inte delas eller krossas och **skall inte tas med mjölk eller mjölkprodukter.**

KOMPLIKATIONER/RISKER

Azatioprin får inte användas tillsammans med giktmedicin som innehåller allopurinol, ej heller tillsammans med Salazopyrin/Sulfasalazin.

Försiktighet ska iaktas vid leversjukdom och försämrad njurfunktion.

Det föreligger ökad risk för hudmalignitet vid behandling av Azatioprin varför försiktighet med solning rekommenderas.

BIVERKNINGAR

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda, går de tillbaka om man minskar dosen eller delar upp dosen på dagen eller tar dem tillsammans med mat. Förekommande biverkningar kan vara illamående, diarre, frossa och feber. Vid provtagning kan man se minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar och ibland ses leverpåverkan med förhöjda leverprover.

KONTROLLER

Under behandlingen skall du lämna blodprover 1 gång i månaden 3 gånger vid behandlingsstart, sedan efter 3 månader och därefter 2 gånger per år enligt rutin. Det är viktigt att du följer det provtagningschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen.

När dina provtagningsremisser tar slut beställer du nya genom att **Logga in** på **1177.se** under **REUMTOLOGIMOTTAGNINGEN UDDEVALLA** för att använda E-tjänster eller ring mottagningen så skickar vi nya.

GRAVIDITET OCH AMNING

Om indikationen att behandla med Azatrioprin är mycket stark kan Azatrioprin användas under graviditet och amning. Rådgör alltid med din reumatolog.

BEHANDLINGSUPPEHÅLL

Under pågående infektion som kräver antibiotika bör man göra uppehåll med Azatioprin, dock ej vid lindrigare infektion såsom lättare förkylningssymtom. Kontakta reumatologimottagningen vid behov av rådgivning.

OPERATION

Man behöver inte göra uppehåll med Azatioprin inför planerad operation men rådgör med operatören.

VACCINATION

Vaccination under behandling är oftast inget hinder men levande försvagade vacciner skall undvikas till exempel: Mässling – Påssjuka - Röda hund (MPR), BCG vaccin mot tuberkulos, bältros och Gula febern.

ÖVRIGT

Informera om att du behandlas med Azatioprin vid sjuk- och tandvårdskontakter. Förvaras i rumstemperatur, oåtkomligt för barn.