



Patientinformation
Reumatologimottagningen NU-sjukvården

LEFLUNOMID

Leflunomid är ett inflammationsdämpande läkemedel som används vid Reumatoid Artrit (ledgångsreumatism) och Psoriasisartrit.

EFFEKT

Leflunomid påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet, vilket innebär att symtom som stelhet, värk, ledsvullnad och trötthet minskar. Förbättringen kommer långsamt, som regel först efter 4 - 6 veckor men kan ibland dröja något längre. Om man har god effekt av behandlingen kan man fortsätta under många år.

DOSERING

Leflunomid filmdragerad tablett finns i styrkorna 10mg och 20mg (kan delas) och tas dagligen. Tabletterna skall sväljas hela och kan tas med mat.

BIVERKNINGAR

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda går de tillbaka om man minskar dosen eller slutar med medicinen. Allvarliga biverkningar är ovanliga. Förekommande biverkningar är:

- Illamående, aptitlöshet, magont, diarré
Huvudvärk, yrsel, lätt blodtrycksstegring
- Infektioner, munsår, eksem, ökat håravfall, seninflammation

Vid provtagning kan man se leverpåverkan med förhöjda levervärden samt minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar.

KONTROLLER

Under behandlingen ska du lämna blodprover 1 gång i månaden 3 gånger vid start, sen efter 3 månader och därefter utglesning till 2 ggr per år enligt ordination. Det är viktigt att du följer det provtagningschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall justera dosen, pausa eller avbryta behandlingen.

Blodtryck kontrolleras en gång i månaden de första tre månaderna av behandlingen och sedan vid återbesök.

Provsvaren skickas till Reumatologmottagningen, där de granskas. Om du inte får något meddelande från oss är dina blodprovsvärden godkända och du fortsätter att ta ditt läkemedel och lämnar prover enligt ordination.

När dina provtagningsremisser tar slut beställer Du nya genom att **Logga in på 1177.se** under **REUMATOLOGIMOTTAGNING UDDEVALLA** för att använda e-tjänster eller ring mottagningen så skickar vi nya. Recept förnyas inte om aktuella provsvar saknas.

BEHANDLINGSUPPEHÅLL

Vid kraftiga infektioner som kräver antibiotika rekommenderas uppehåll med Leflunomid.

OPERATION

Om du ska opereras behöver du oftast inte göra uppehåll med Leflunomid. Leflunomid kan dock påverka sårhäkning så informera din opererande läkare om din behandling.

GRAVIDITET OCH AMNING

Leflunomid får **inte ges** vid planerad eller pågående graviditet då den kan orsaka allvarliga fosterskador. Säkert preventivmedel ska användas (gäller även för män). Vid inträffad graviditet kontakta läkare (gäller även för män). Man kan då med speciella läkemedel avlägsna Leflunomid ur blodet genom att göra en så kallad "wash out". Man ger då aktivt kol eller kolestyramin under upp till två veckor och därefter tar man ett koncentrationsprov för att se att läkemedlet har "tvättats" bort. "Wash out" ska göras minst tre månader före planerad graviditet (gäller både för män och kvinnor). Leflunomid skall inte ges under amning.

"Wash out" kan även göras vid inträffad allvarlig biverkan.

VACCINATION

Vaccination under behandlingen är inget hinder men levande försvagade vacciner bör undvikas till exempel Mässling – Påssjuka – Röda hund (MPR), BCG vacciner mot tuberkulos, bältros och gula febern.

ALKOHOL

Det finns risk för leverpåverkan vid alkoholintag. Mängden alkohol avgör påverkan på din lever.

ÖVRIGT

Leflunomid har lång halveringstid. Försiktighet skall vidtas vid nedsatt njur- och leverfunktion.

Informera om att du behandlas med Leflunomid vid sjuk- och tandvårdskontakter.

Förvaras i rumstemperatur, oåtkomligt för barn.