

## Patientinformation på arabiska

### Patientinformation mat och dryck inför ditt barns operation\_arabiska

- يسمح للطفل تناول الطعام (طعام ثابت) حتى 6 ساعات قبل موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها.
- حليب الثدي ومعوّضات حليب الثدي والثريد (ليس حبوب كاملة) والحليب واللبن الزبادي بدون قطع فواكه يمكن أن يشربها الطفل حتى أربع ساعات قبل موعد العملية الجراحية.
- لا يسمح للطفل استخدام العلكة أو أي شكل من أشكال التبغ قبل ساعتين من موعد العملية الجراحية.
- يسمح للطفل شرب السوائل الشفافة (الماء بدون غاز، قهوة/شاي بدون حليب عصير/شراب بدون لب الفواكه/قطع فواكه) حتى وقت حضوركم إلى المستشفى. لا يسمح تناول مشروبات منتجات الألبان.

#### لاحظ

من أجل سلامة الطفل فمن المهم جدا اتباع القواعد المبينة أعلاه. يسري هذا على كل من العمليات الجراحية التي تتم بالتخدير التام والتخدير الموضعي.

في حالة عدم اتباع هذه القواعد يتم إلغاء موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها الطفل.