



Patientinformation

Esofagusmanometri inklusive impedans/PH-mätning

OBS!

Ring oss på 010-435 26 00 (telefontid enligt första sidan) eller kontakta oss via 1177.se, senast 7 dagar före undersökningsdagen för att bekräfta tiden.

Syfte

Att bedöma funktionen av och eventuell förekomst av saltsyra i matstrupen.

Förberedelser

Från 4 timmar före undersökningen får du inte äta eller dricka.

VECKAN FÖRE undersökningen ska du avstå från magmedicin som hämmar syrasekretion t. ex Lanzo, Losec, Nexium, Nizax, Omeprazol, Esomeprazol, Pantoloc, Pariet, Pepcid, Ranitidin eller Zantac.

Från 4 fyra timmar före undersökningen får du inte ta: Gaviscon, Link, Novalucid, Novalucol eller Rennie.

Ta med en lista på dina mediciner.

Utförande

Du får ligga i en stol. Vi bedövar i näsan, för en tunn slang genom näsan ner i matstrupen och registrerar trycket. Därefter byter vi till en slang, som mäter surhetsgraden (pH), kopplad till en registreringsdosa i en väska vid midjan. Du lämnar avdelningen, efter 1 dygns registrering lämnar du tillbaka utrustningen.

Undersökningstid

Cirka 1,5 timma hos oss. Därefter 1 dygn med bärbar registreringsdosa.